

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo Químico: DECCOZIL 50 EC es un producto en base a Imazalilo perteneciente al grupo químico de los Imidazoles.

Durante su **preparación y aplicación** debe usarse como protección antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables, overol impermeable y botas de goma. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. Después de manipular el producto, lavarse con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Mantener el producto siempre en su envase original debidamente cerrado, etiquetado, en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Información Ecotoxicológica: DECCOZIL 50 EC es moderadamente tóxico para peces, microcrustáceos, algas. No tóxico para abejas y aves.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“EN APLICACIONES DE POSTCOSECHA LOS MANIPULADORES, CARGADORES Y PERSONAL QUE MANIPULA LA FRUTA TRATADA DEBEN UTILIZAR ROPA DE PROTECCIÓN”

Instrucciones para el Triple Lavado

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Síntomas de Intoxicación: Irritación de ojos, piel y mucosas. Dificultad respiratoria, tos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos y lavar antes de volver a usar. Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a utilizar. Si la irritación persiste, consultar con un especialista.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente, si la irritación persiste, consultar con un especialista.

Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca si la persona está inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Inhalación: Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Colocar al paciente tendido en posición horizontal, tapanlo y mantenerle el calor. Llame inmediatamente al médico.

Antídoto: No se conoce antídoto específico

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia: RITA CHILE: (56-2) 2777 1994

DECCOZIL 50 EC

FUNGICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

DECCOZIL 50 EC es un fungicida de contacto para el control de enfermedades de post cosecha indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso, en cítricos.

COMPOSICIÓN:

Imazalilo*.....50% p/v (500 g/L)
Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1 L)

* (RS)-1-(β-aliloxi-2,4-diclorofenil)imidazol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero
N°2.921

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO >>

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Lote N°:

Fecha de Fabricación: (mes y año)

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

Fabricado por:

Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U.
C/Villa de Madrid, 54.
Polígono Industrial Fuente del Jarro
46988 Paterna. Valencia
España

Laboratorios Agrochem S.L.
Tres Rieres, 10 – 08292 Esparraguera, Barcelona
España

Importado y Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO:

DECCOZIL 50 EC es un fungicida sistémico para uso de post cosecha en cítricos (naranjas, mandarinas, limonero, clementinas y pomelos), en plantas embaladoras de fruta, para el control de *Penicillium spp.*, *P. digitatum* y *P. italicum*, *Phmopsis sp.* y *Diplodia sp.*, como se aprecia en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Naranja, mandarina, limonero, clementina, pomelo	Putrición verde (<i>Penicillium digitatum</i>), Putrición azul (<i>Penicillium italicum</i>), Putrición <i>Penicillium spp.</i> , <i>Phomopsis sp.</i> , <i>Diplodia sp.</i>	100 cc/100 L de agua para aplicación en drencher (“Ducha”)	Aplicar directamente sobre la fruta, mediante ducha (sistema “drencher”) durante 25 a 30 segundos, en el momento de la recepción, previamente a la entrada en la cámara de almacenaje. Alternativamente se puede aplicar mediante aspersión a bajo volumen en la línea de proceso, a dosis de 200 a 300 cc/100 L de agua antes del encerado, o bien en mezcla con ceras autorizadas al 0,4 – 0,8%, mediante pulverización o con sistema de gota controlada, vigilando la homogeneidad del gasto del producto, del paso de la fruta y concentración del caldo
		200 a 300 cc/100 L de agua para aplicación en túnel (Pulverización)	

Preparación de la mezcla: Agitar el envase antes de usarlo. Diluir el producto en el agua de tratamiento por medio de agitación y con dicha mezcla duchar o sumergir las frutas a tratar. Si la mezcla ha sido preparada con mucha anticipación (más de 5 horas) es conveniente agitarla antes de proceder al mojado.

Compatibilidad: Compatible con ceras.

Incompatibilidad: Se recomienda no mezclar con otros pesticidas. Si es necesario mezclar es aconsejable realizar una prueba previa de compatibilidad.

Fitotoxicidad: No se ha detectado fitotoxicidad cuando el producto es utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso.

Tiempo de Reingreso: Dada la naturaleza de aplicación no corresponde definir tiempo de reingreso al área de aplicación para personas ni animales.

Período de Carencia: DECCOZIL 50 EC no tiene periodos de carencia, por cuanto es utilizado en postcosecha. Para cultivos de exportación, atenderse a las exigencias del país de destino.

NOTA AL COMPRADOR: Garantizamos que este producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y es adecuado para los usos propuestos en la etiqueta solo cuando se emplea de acuerdo con las pautas bajo las condiciones de uso normales. No es posible eliminar todos los riesgos inherentes asociados al uso del producto. Pueden darse daños en los frutos tratados, falta de eficacia y otras consecuencias imprevistas debido a otros factores como variedad, tratamientos precosecha, climatología, desverdizado o frigoconservación, modo de uso o aplicación distinto al especificado en la etiqueta, etc., todos ellos fuera de nuestro control. En ningún caso el Fabricante será responsable de las consecuencias, daños especiales o indirectos resultantes del uso o manipulación de este producto. Todos los riesgos deberán ser asumidos por el comprador. No se garantiza el comercio u otro fin particular distinto al mencionado en la etiqueta.



NOXIOSO

