

ACOIDAL® FLO

AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA INSTRUCCIONES DE USO

ACOIDAL® FLO está indicado para el control de plagas y enfermedades indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso, en los cultivos mencionados en éste.

CUADRO INSTRUCCIONES DE USO

CUADRO INSTRUCCIONES APLICACIONES TERRESTRES

CULTIVO	PLAGA/ OBJETIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
		(cc/ 100 L)	L/ ha	
Almendo, Cerezo, Ciruelo	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	200-350		Aplicar en forma preventiva, con muy buen cubrimiento en botón floral y al final de caída de pétalos. Repetir con intervalo de 10 días de acuerdo con las condiciones climáticas que favorezcan su desarrollo. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Duraznero, Nectarines	Prevención de arañas (Araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>), araña bimaclada (<i>Tetranychus urticae</i>))	300-700		Usar dosis mayor en forma preventiva y con volúmenes de agua que permitan una adecuada cobertura del follaje. Repetir cada 10-15 días. No más de 12 aplicaciones en la temporada.
	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	200-350		Comenzar al final de caída de pétalos. Repetir cada 10 días, según la ocurrencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
	Roya (<i>Puccinia striiformis</i>)	400		Comenzar al final de caída de pétalos. Repetir cada 10 días, según la ocurrencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. En caso de Roya aplicar al observar las primeras pústulas en las hojas.
Peral	Oídio	130-170		Comenzar en caída de pétalos. Repetir en caso necesario cada 10 a 15 días. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Cerezo, Ciruelo, Damasco	Prevención de arañas (Araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>), Araña bimaclada (<i>Tetranychus urticae</i>))	300-700		Usar dosis mayor en forma preventiva y con volúmenes de agua que permitan una adecuada cobertura del follaje. Repetir cada 10-15 días. No más de 12 aplicaciones en la temporada.
Manzano	Prevención de arañas (Araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>), araña bimaclada (<i>Tetranychus urticae</i>))	antes de flor 400-600; después de flor 200-300		No aplicar después del cambio de color de la fruta. Aplicar al observar la presencia de arañas, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de la plaga y la dosis mayor cuando encuentre alta presión de arañas. Repetir cada 10 -15 días. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
	Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	200-350 130-170		Antes de floración Comenzar en caída de pétalos. Repetir en caso necesario cada 10 a 15 días. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Limonero, Mandarino, Pomelo, Naranja	Prevención de arañas (araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>), Ácaro ancho (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>), Falsa araña roja de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>))	300-500		Aplicar al observar la presencia de arañas, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de la plaga y la dosis mayor cuando encuentre alta presión de arañas. Repetir cada 10 -15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.
	Prevención del Ácaro de la yema (<i>Eriophyes sheldoni</i>)			
Paltos	Araña roja del palto (<i>Oligonychus yothersi</i>)	200-400	2-8	Aplicar al observar la presencia de arañas, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de la plaga y la dosis mayor cuando encuentre alta presión de arañas. Repetir cada 10 -15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.
Tomate	Eriódido del tomate (<i>Aculops lycopersici</i>)	200-300		Aplicar al inicio de la aparición de síntomas en las hojas y repetir cada 10 días, de acuerdo con la presión de la plaga. Aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de la plaga y la dosis mayor cuando encuentre alta presión de arañas. No más de 12 aplicaciones por temporada.
	Oídio		2-3	Aplicar al observar los primeros síntomas en las hojas y repetir según condiciones cada 7 a 15 días. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Vid - Parronales	Prevención de arañas (Araña roja de la uva de mesa (<i>Oligonychus vitis</i>), Falsa araña roja de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>), Prevención de la Erinosis de la vid (<i>Colomerus vitis</i>))	200-400	2-8	Aplicar al observar la presencia de arañas, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de la plaga y la dosis mayor cuando encuentre alta presión de arañas. Repetir cada 10 -15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.
	Oídio (<i>Erysiphe Uncinula</i>) necator	200-300		Aplicar preventivamente con brotes desde 10-15 cm., repitiendo con intervalos de 7 a 10 días o cada nuevo crecimiento vegetativo. Utilizar la dosis menor cuando exista baja presión de la enfermedad. Utilizar la dosis mayor según desarrollo vegetativo y severidad de la infección. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
Melón, Pepino Sandía, Zapallo	Araña bimaclada (<i>Tetranychus urticae</i>), Prevención de arañas: Araña carmin (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	250-300	0,6 - 1,5	Aplicar al observar la presencia de arañas, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de la plaga y la dosis mayor cuando encuentre alta presión de arañas. Repetir cada 10 -15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.
	Oídio		2-3	Aplicar al observar los primeros síntomas en las hojas y repetir según condiciones cada 7 a 15 días. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Zapallo Italiano, Alcachofa, Arveja	Oídio		2-3	Aplicar al observar los primeros síntomas en las hojas y repetir según condiciones cada 7 a 15 días. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Aji, Pimentón	Oídio	250-350		Aplicar al observar los primeros síntomas en las hojas y repetir según condiciones cada 7 a 15 días. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Frutilla, Frejol, Papa	Oídio		2-3	Aplicar según condiciones de infección y repetir cada 10-15 días. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Rosas, Crisantemos, Claveles, Gladiolo	Oídio	200-250		Aplicar al observar los primeros síntomas en las hojas y repetir según condiciones cada 7 a 15 días. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Rosas, Claveles	Prevención de arañas: Araña bimaclada (<i>Tetranychus urticae</i>), araña carmin (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	250-300		Aplicar al aparecer los primeros ejemplares. aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de la plaga y la dosis mayor cuando encuentre alta presión de arañas. Repetir cada 10-15 días. No más de 12 aplicaciones en la temporada.
Remolacha azucarera	Oídio (<i>Erysiphe betae</i>)		4-7	Comenzar las aplicaciones en forma preventiva. Repetir cada 10 a 15 días. Aplicar un máximo de 12 veces por temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad y la dosis mayor cuando exista una alta presión de oídio.
Avellano Europeo	Oídio (<i>Phyllactinia guttata</i>)	200 - 400		Aplicar dos (2) veces en brotación, con un intervalo de 20 días entra cada aplicación. Usar la dosis menor para cuando exista baja presión de oídio y la dosis mayor para cuando exista alta presión de oídio. Usar un mojamiento de 1800 L de agua por ha

CUADRO INSTRUCCIONES APLICACIONES AÉREAS

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE

PARA APLICACIONES AÉREAS PROHÍBESE TODA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS, CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO SUPERE LOS 15 KM/HORA

Vid - Parronales	Prevención de arañas (Araña roja de la uva de mesa (<i>Oligonychus vitis</i>), Falsa araña roja de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>), Prevención de la Erinosis de la vid (<i>Colomerus vitis</i>))	200-400	2-8	Aplicar al observar la presencia de arañas, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de la plaga y la dosis mayor cuando encuentre alta presión de arañas. Repetir cada 10-15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada. Aplicar con un mojamiento de 20-40 Lt/ ha.
	Oídio (<i>Erysiphe Uncinula</i>) necator		4-7	Aplicar preventivamente con brotes de 10 a 15 cm repitiendo con intervalos de 7 a 10 días o a cada nuevo crecimiento vegetativo. Utilizar la dosis menor cuando exista una baja presión de la enfermedad. Utilizar la dosis mayor según desarrollo vegetativo y severidad de la infección. Repetir no más de 12 veces en la temporada. Aplicar con un mojamiento de 20-40 Lt/ ha.
Paltos	Araña roja del palto (<i>Oligonychus yothersi</i>)	200-400	4-8	Aplicar al observar la presencia de arañas, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Aplicar la dosis menor cuando exista baja presión de la plaga y la dosis mayor cuando encuentre alta presión de arañas. Repetir cada 10-15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada. Aplicar con un mojamiento de 20-40 Lt/ ha.

Preparación de la mezcla: Mezclar ACOIDAL® FLO en un balde con un poco de agua. Luego adicionar al estanque y completar a volumen total con agitación constante. Utilizar mojamiento en vides y frutales de 1000-2000L de agua/ha., y en cultivos bajos 250 a 500L/ha. **Incompatibilidad:** incompatible con Dinitrofenoles, Fenvalerato, Clorpirifos, Dimetoato y Aceites minerales. No aplicar antes de transcurridas 2 semanas de una aplicación de aceite, excepto si los tratamientos se realizan en período de dormancia. Para cítricos, no aplicar antes de 21 días de alguna aplicación de aceite. No aplicar sobre cucurbitáceas (melón, sandía, pepino y zapallo) cultivados bajo condiciones de invernaderos. En manzanos, no aplicar después del cambio de color de la fruta ni en mezcla con Captan para variedades rojas. Evite aplicar con T° > 30°C. **Fitotoxicidad:** No es fitotóxico a las dosis y épocas señaladas. **Periodo de carencia:** No tienes restricciones de carencia. **Tiempo de reingreso:** Las personas y animales no deben ingresar al área tratada antes de 24 horas después de realizada la aplicación.

