

HERBICIDA

DAZZLER® 50 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3521

DAZZLER® 50 SC, herbicida suelo activo con actividad al follaje, indicado para el control selectivo de las malezas anuales descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

*Diurón	50 % p/v (500 g/l)
Coformulantes c.s.p.....	100 % p/v (1 l)
* 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO – CHILE

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA – CHILE

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang,
China

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

DAZZLER® 50 SC, herbicida cuyo ingrediente activo Diuron pertenece al grupo químico de las Ureas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con velocidad de viento mayor a 5 m/seg y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la aplicación y preparación del producto. Después de la aplicación bañarse y cambiarse de ropa, lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

DAZZLER® 50 SC, es moderadamente tóxico para peces, ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos y aves. Es ligeramente tóxico a abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para Triple Lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios : **En caso de contacto cutáneo:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si es necesario acudir a un médico. **En caso de contacto ocular:** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** trasladar al afectado a un centro asistencial

Síntomas de intoxicación: irritación de piel y ojos, dolor abdominal, diarrea, náuseas.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfono de emergencia:(2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **DAZZLER® 50 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

©Marca registrada de ANASAC.



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

DAZZLER® 50 SC, herbicida que controla malezas anuales, Ambrosia, Ballica, Bledo, Bolsita del pastor, Capuli, Cola de ratón o Vulpia, Duraznillo, Enredadera, Hualcacho, Manzanilla, Ortiga, Pasto miel, Pasto pinito, Pasto oloroso, Pata de gallina, Pega-pega, Piojillo, Quilloi-quilloi, Quinguilla, Rábano, Yuyo, Sanguinaria, Tomatillo y Verdolaga. Se consideran malezas resistentes: Cola de caballo, Maicillo, Hierba de la culebra, Senecio y Verónica.

Cuadro de Instrucciones de uso:

CULTIVOS	DOSIS (*) (L/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Viñas, Parronales, Manzano, Peral, Membrillo, Duraznero, Nectarino, Damasco, Almendro, Cerezo, Ciruelo, Nogal, Naranja, Limonero, Mandarino, Clementino, Pomelo, Tangelo, Granado, Frambueso, Mora, Arándano, Palto, Olivo	4,0 – 6,0	Aplicar en Otoño-Invierno sobre suelo libre de malezas, en plantas de más de 3 años. No usar en suelos con menos de 2% de materia orgánica. Volumen de agua sugerido: 200 L/ha
Alcachofa	3,0 – 6,0	Aplicar en la entre hilera sobre alcachofa establecida, evitando mojar el follaje. Aplicar a fin de Otoño o principios de Invierno. Volumen de agua de 300-400 lt/ha. Carencia: NC
Alfalfa	3,2 – 4,8	Aplicar en invierno después de un corte, antes de la emergencia de las malezas, cuando la alfalfa entra en latencia hasta antes del crecimiento de primavera. Solo en alfalfa establecida de más de un año. Volumen de agua de 300 a 400 L/ha. Carencia: NC
Cebada, Trigo, Avena	1,6 – 2,4	Aplicar inmediatamente después de la siembra en cultivos de invierno. Volumen de agua: 200-400 lt/ha. Carencia: NC
Espárrago	3,2 – 6,4	No aplicar en suelos con menos de 2% de materia orgánica. En esparragueras nuevas transplantadas, tapar la corona con 10 cm de tierra y luego aplicar. Incorporar con agua. En esparragueras establecidas, aplicar hasta 20 días antes del inicio de la cosecha. Efectuar segunda aplicación inmediatamente después de cosecha y si se espera una lluvia. Volumen de agua: 300-400 lt/ha. Carencia: NC.
Empastadas: Festuca y Pasto ovillo	1,6 – 3,2	Aplicar durante el receso vegetativo en semilleros de más de un año, para controlar malezas anuales. Volumen de agua: 400-600 lt/ha. Carencia: NC

N.C.: No corresponde.

En MANZANO, PERAL, NOGAL, NARANJO, POMELO, MANDARINO, FRAMBUESA, ARÁNDANO, MORA, OLIVO, VID, KIWI, DURAZNERO, NECTARINO, CEREZO, CIRUELO, ALMENDRO, PALTO, **Con presencia de malezas se puede mezclar con herbicidas post-emergentes.**

(*) Emplear las dosis menores en suelos livianos y las mayores en suelos pesados o con alto contenido de materia orgánica.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por temporada. Normalmente el producto se aplica una vez, en caso de repetir hacerlo con un intervalo mínimo de 30 días.

Instrucciones de uso: En Espárragos se puede mezclar con Simazina, Trifuralina o Bectra, para ampliar el espectro de control.

Preparación de la mezcla: Lavar profusamente el estanque del equipo aplicador. Llenar el estanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **DAZZLER® 50 SC**, luego completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo agitación constante.

Incompatibilidades: Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos recomendados, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de Reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

Clasificación HRAC: Grupo C2, inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II.

Bajo ciertas condiciones existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o cambios en la sensibilidad a herbicidas. Esto puede ocurrir a través de una variación genética normal en cualquier población de malezas y llegar a afectar a **Dazzler® 50 SC** como a otros productos de su mismo grupo químico. Estas razas resistentes pueden llegar a ser dominantes después del uso repetido de este grupo de herbicidas y la población será de difícil control con estos productos. La ocurrencia de poblaciones resistentes o menos sensibles es difícil de detectar antes de la aplicación de **Dazzler® 50 SC**, por lo que Anasac no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de éstas. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o a algún especialista.



NOCIVO

