

**Santiago, 24 de junio de 2021**

**Señor  
Rodrigo Astete Rocha  
Jefe División Protección Agrícola y Forestal  
Servicio Agrícola y Ganadero  
Av. Presidente Bulnes N° 140  
Santiago**

- At. Señora Alejandra Aburto, Jefa Subdepartamento Viñas y Vinos, Inocuidad y Biotecnología.

Ref. Declaración de eficacia del plaguicida **Trebon 30 EC**, Etofenprox, Concentrado Emulsionable (EC), 28,75 p/v (287,5 g/l), Autorización SAG N° 1890 para el control de *Lobesia botrana* en frutos de arándanos (*Vaccinium corymbosum*) en Chile.

Summit Agro Chile SpA certifica que es posible recomendar el uso del insecticida Trebon 30 EC, Autorización SAG N° 1890, para el control de *Lobesia botrana*, el cual es efectivo en variedades de arándanos.

Trebon 30 EC para el control de *Lobesia botrana* puede ser aplicado en 2 oportunidades con un intervalo de 10 días entre aplicaciones durante la temporada, desde en el estado fenológico de preflor hasta pre cosecha, dependiendo de las restricciones establecidas en la etiqueta del producto y/o los países de destino de la producción.

La concentración de Trebon 30 EC para el control de *Lobesia botrana* y período de protección por aplicación se describe a continuación:

<b>Especie</b>	<b>Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria convencional</b>	<b>Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria bajo volumen</b>	<b>Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria electroestática</b>	<b>Período de protección por aplicación (días)</b>
Arándanos	50	No recomienda	No recomienda	10

Para lograr la mayor efectividad en el control, considerar que las siguientes condiciones ambientales pueden disminuir la eficacia de Trebon 30 EC: Temperaturas extremadamente bajas.

**Trebon 30 EC** debe ser aplicado en el momento de INICIO DE ECLOSIÓN a MÁXIMA ECLOSIÓN dirigiendo la aspersión a flores y frutos para el control de LARVAS.

Considerar que Trebon 30 EC presenta toxicidad ALTA para abejas y toxicidad BAJA para los enemigos naturales, recomendándose evitar aplicar en los momentos de máxima actividad de abejas.

Etofenprox, ingrediente activo de Trebon 30 EC, actúa por CONTACTO e INGESTIÓN y su mecanismo de acción está clasificado como PIRETROIDE (GRUPO QUÍMICO: MODULADORES DEL CANAL DE SODIO; Grupo 3A (IRAC)).

Etofenprox, no tiene tolerancia para arándanos en Chile según se indica en el cuadro siguiente. Su período de carencia establecido en etiqueta es el que se indica en el siguiente Cuadro:

Ingrediente activo	Arándanos (ppm)	Período de carencia (días)	Fuente *(2)
Etofenprox	0.01	120	Unión Europea

\*(1) Justificar la carencia con documentación anexa a esta declaración de eficacia (Declaración de residuos)

\*(2) Indicar Resolución Exenta N° 892 de 2020, del MINSAL, para moléculas incluidas en estas resoluciones. En caso que la fuente sea otra, indicar de acuerdo a la secuencia establecida en dicha Norma.



**Martín Merino**  
Marketing and Development Manager  
Summit Agro Chile SpA

**Martín Merino L.**  
Gerente de Marketing e Investigación y Desarrollo.  
Summit Agro Chile SpA.