

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: El Ingrediente Activo Lambda-cihalotrina pertenece al grupo de los Piretroides.

Precauciones de Uso: Durante la preparación utilizar equipo de protección completo: overol impermeable, botas de goma, guantes impermeables y protector facial. Durante la aplicación utilizar equipo de protección completo: overol impermeable para aplicación de plaguicidas, antiparras, botas de goma, guantes impermeables y máscara con filtro. Proteger la cabeza. No comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. No inhalar los vapores o aspersiones del producto. No aplicar contra el viento. Evitar la ingestión del producto, el contacto con la piel y los ojos. No contaminar alimentos, semillas, forrajes, ni cursos de agua. No permitir la entrada de terceras personas ni animales en áreas que están siendo sometidas a tratamiento o preparación del producto.

Síntomas de intoxicación: Ingestión si el producto es ingerido accidental o voluntariamente los síntomas esperados incluyen náusea, vómitos, cefaleas, dolores abdominales, diarrea, ataxia y convulsiones. Inhalación de grandes cantidades y la inhalación sucesiva o repetida, pueden causar neumonitis química. Contacto con la piel, prolongado o repetido puede causar irritación dérmica. En personas más sensibles puede producir reacciones alérgicas. Contacto con los ojos puede causar irritación temporal en los ojos.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Buscar atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consulte a un médico si se presenta irritación o dolor. En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consulte a un médico si se presenta irritación o dolor. En caso de inhalación: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Trasladar a un centro asistencial.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático y de soporte. Administrar carbón activado cuando la cantidad ingerida sea tóxica y evalúe realizar lavado gástrico.

Información Ecotoxicológica: Lambda-cihalotrina tóxico para abejas, prácticamente no tóxica para aves, moderadamente tóxico para algas y microcrustáceos acuáticos y extremadamente tóxico para peces, por lo que el producto no debe ser eliminado en cauces de agua y alcantarillado.

Teléfonos de emergencia:

RITA-CHILE: (2) 2777 1994. POINT CHILE S.A.. (2) 2747 1677

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS Y DESTRUIR DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“RETIRAR COLMENAS PREVIO A LA APLICACIÓN”

Instrucciones de Triple Lavado: Agregar agua hasta $\frac{1}{4}$ de su capacidad, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido en la pulverizadora. Repetir esta operación TRES VECES. Luego, destruir los envases vacíos, cortándolos o perforándolos, y eliminarlos de acuerdo a las instrucciones de las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas y aguas. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.

Precauciones de almacenaje: Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible; en un lugar fresco, seco, bien ventilado, lejos del fuego, bajo techo y seguro bajo llave.

Aviso al consumidor: Se garantiza la óptima calidad del producto y los porcentajes de ingredientes activos señalados en la etiqueta, hasta que el producto salga de nuestro control directo. No se da ningún tipo de garantía por consecuencias derivadas de la aplicación, ya que el manejo del producto es de responsabilidad absoluta del usuario.

INVICTO[®] 50 CS

INSECTICIDA

SUSPENSIÓN DE ENCAPSULADO (CS)

Ingrediente activo por litro

Lambda-cihalotrina(*) 5 % p/v (50 g/L)
Coformulantes c.s.p. 100% p/v (1 Litro)

*Mezcla racémica del par de enantiómeros B de la cihalotrina:

(1S,3S)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (R)- α -ciano-3-fenoxibencilo.

(1R,3R)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)- α -ciano-3-fenoxibencilo.

Invicto[®] 50 CS es un insecticida piretroide de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Recomendado para el control de insectos masticadores y picadores-chupadores en estado larvario y adulto en los cultivos indicados en el cuadro de instrucciones de uso.

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - CORROSIVO

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.833

Importado y Distribuido por:

Fabricado por:

Point International Ltd.
42 St. Margarets Grove
Twickenham TW11JG,
England

Point Agro-China Ltd.
Wan Shi Town Yixing City
Jiangsu 214217,
China



Point Chile s.a.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Avda. Presidente. E. Frei Montalva N° 9950 Of. 10,
Quilicura, Santiago-Chile
Fono: (56 2) 2747 1677
Fax: (56 2) 2747 1677 anexo 106

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO
Invento® 50 CS es un insecticida piretroide de amplio espectro, recomendado para el control de insectos masticadores y picadores-chupadores en estado larvario y adulto en los cultivos indicados en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones para Aplicaciones Terrestres
Nota: hL = hectolitro o 100 Litros

Cultivos	Plagas	Dosis (cc/hL)	Observaciones
Damasco, Duraznero, Nectarino, Ciruelo, Cerezo, Guindo, Almendro	Pulgones: <i>Appelia tragopogonis</i> , <i>Brachycaudus helichrysi</i> , <i>Brachycaudus schartzi</i> , <i>Brachycaudus persicae</i> , <i>Myzus persicae</i> ; Polilla Oriental: <i>Grapholita molesta</i> .	10 - 20	Aplicar al observar los primeros insectos. Realizar un máximo de 4 aplicaciones en la temporada dejando pasar 10 a 30 días entre cada aplicación. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 1.500 L de agua/ha.
	Chape del cerezo: <i>Caliroa cerasi</i> ; Eulias: <i>Proeulia spp.</i>	20 - 40	
Cerezos, Ciruelos, Pluot, Plumcot, Nectarines, Durazneros, Damascos	Mosca de alas manchadas: <i>Drosophila suzukii</i>	20	Se recomienda realizar la aplicación tan pronto se detecte la presencia de la plaga desde el estado de pinta. Realizar un máximo de 2 aplicaciones en la temporada con un intervalo de 12 días. Importante alternan con productos que posean distinto modo de acción. Utilizar un mojamiento de 1.500 L de agua/ha.
Manzano, Peral, Membrillo	Polilla de la Manzana: <i>Cydia pomonella</i>	10 - 20	Aplicar al observar los primeros insectos. Realizar un máximo de 4 aplicaciones en la temporada dejando pasar 10 a 30 días entre cada aplicación. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 2.000 L de agua/ha.
	Eulias: <i>Proeulia spp.</i> ; Psílido del peral: <i>Cacopsylla bidens</i> ; Eulias: <i>Proeulia spp.</i> ; Gusano de los penachos: <i>Orgia antiqua</i> .	20 - 40	
Nogal	Polilla de la Manzana: <i>Cydia pomonella</i> .	20	Aplicar al observar los primeros insectos. Realizar un máximo de 4 aplicaciones en la temporada dejando pasar 10 a 30 días entre cada aplicación. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 3.000 L de agua/ha.
Uva de mesa, Uva pisquera, Vid vinífera,	Eulias: <i>Proeulia spp.</i>	20 - 40	Aplicar al observar los primeros insectos. Utilizar la concentración más alta con larvas mayores a 0,5 cm de largo. Aplicar hasta 2 veces por temporada a intervalos de 10 y 30 días. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 1.000 L de agua/ha.
Palto	Trips del palto: <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> .	10	Aplicar al observar los primeros insectos. Realizar un máximo de 4 aplicaciones en la temporada dejando pasar 10 a 20 días entre cada aplicación. Para cultivos en pleno desarrollo, se recomienda utilizar un mojamiento de 3.000 L de agua/ha, asegurando un buen mojamiento de la parte baja e interior de la copa.
Arándanos, Frambuesas, Moras, Frutillas, Zarparrillas	Mosca de alas manchadas: <i>Drosophila suzukii</i>	20	Se recomienda realizar la aplicación tan pronto se detecte la presencia de la plaga desde el estado de pinta. Realizar un máximo de 2 aplicaciones en la temporada con un intervalo de 12 días. Importante alternan con productos que posean distinto modo de acción. Utilizar un mojamiento de 1.000 - 1.500 L de agua /ha. Para Frutillas mojar con 800 - 1.000 L de agua/ha., dependiendo del estado fenológico del cultivo.
Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora	Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Capitophorus spp.</i> , <i>Cavariella aegopodi</i> , <i>Macrosiphum solanifolii</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Acyrtosiphon pisum</i> . Larvas minadoras: <i>Liriomyza sativae</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> . Langostinos: <i>Parathanus exitiosus</i> , <i>Empoasca curveola</i> ; Trips: <i>Frankliniella cestrum</i> , <i>Thrips tabaci</i> ; Burritos: <i>Naupactus spp.</i> , <i>Pantomorus spp.</i> ; Cuncunillas: <i>Agrotis spp.</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Copitarsia spp.</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Melittia cucurbitae</i> , <i>Rhizotelia xylostella</i> , <i>Trichoplusia ni</i> ; Pilmes: <i>Epicauta pilme</i> ; Polillas: <i>Tuta absoluta</i> , <i>Phthorimaea operculella</i> . Chinche verde: <i>Nezara viridula</i> .	150 - 250 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. En berries hacer máximo 2 aplicaciones en la temporada, separadas por 7 a 21 días. Mojamiento de 1.000 a 1.500 L de agua/ha, dependiendo del desarrollo del cultivo. En cebolla, ajo, brócoli, coliflor, tomate y pimiento hacer máximo 4 aplicaciones por temporada, separadas 7 a 21 días. Para los demás cultivos hacer máximo 2 aplicaciones en la temporada, separadas entre 7 a 21 días. En leguminosas y hortalizas utilizar un mojamiento de 300 a 800 L de agua/ha, dependiendo de su desarrollo.
Ajo, Betarraga, Cebolla, Brócoli, Coliflor, Zanahoria, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo Arveja, Haba, Lenteja, Poroto, Soya, Tomate, Pimiento, Papa	Cuncunillas: <i>Dalea spp.</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia spp.</i> ; Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Diuraphis noxia</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Schizaphis graminum</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Máximo 3 aplicaciones en la temporada, separadas 10 a 30 días. Utilizar un mojamiento mínimo de 100 L de agua/ha, dependiendo del tipo de cultivo y estado de desarrollo del cultivo.
Maíz	Gusanos cortadores: <i>Agrotis bilitura</i> , <i>Copitarsia turbata</i> , <i>Elasmopalpus lignosellus</i> , <i>Pseudaletia unipuncta</i> , <i>Spodoptera frugiperda</i> .	250 - 350 cc/ha	Aplicar luego de la emergencia del cultivo, de manera curativa, dirigido a la hilera, preferentemente al atardecer. Utilizar un mínimo de 200 L de agua/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada a intervalos de entre 3 a 7 días.
	Gusano del choclo: <i>Helicoverpa zea</i>	200 - 250 cc/ha	Aplicar 2 días después de observar el 5% de estilos. Repetir 4 días después de la primera aplicación y 7 días después de la segunda aplicación.
Raps, Remolacha, Maravilla	Cuncunillas: <i>Plutella xylostella</i> , <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Copitarsia turbata</i> , <i>Rachiplusia ni</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia unipuncta</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Plusia spp.</i> ; Pilmes: <i>Epicauta pilme</i> ; Pulgones: <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis brassicae</i> , <i>A. fabae</i> , <i>A. gossypii</i> ; Larvas minadoras: <i>Liriomyza huidobrensis</i> ; Langostinos: <i>Empoasca curveola</i> , <i>Parathanus exitiosus</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Utilizar la dosis mayor en situaciones de alta presión de plagas. Aplicar hasta 2 veces por temporada, a intervalos de entre 10 y 30 días, con un mínimo de 100 L de agua/ha, dependiendo del equipo de aplicación, tipo de cultivo y estado fenológico.
Lechuga, acelga, achicoria, espinaca	Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Capitophorus spp.</i> , <i>Cvariella aegopodi</i> , <i>Macrosiphum solanifolii</i> , <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> . Larvas minadoras: <i>Liriomyza sativae</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> ; Langostinos: <i>Paraethanus exitiosus</i> , <i>Empoasca curveola</i> ; Trips: <i>Frankliniella cestrum</i> , <i>Thrips tabaci</i> ; Burritos: <i>Naupactus spp.</i> , <i>Pantomorus spp.</i> ; Cuncunillas: <i>Agrotis spp.</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Copitarsia spp.</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Melittia cucurbitae</i> , <i>Trichoplusia ni</i> ; Pilme: <i>Epicauta pilme</i> ; Chinche verde: <i>Nezara viridula</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Hacer un máximo de 2 aplicaciones en la temporada, separadas entre 7 a 21 días. Utilizar un mojamiento de 300 a 800 L de agua/ha, dependiendo de su desarrollo.

Cuadro de Instrucciones de Uso para Aplicación Terrestre (continuación)

Cultivos	Plagas	Dosis	Observaciones
Brócoli, Coliflor, Repollo, Repollo de Bruselas, Kale, Pak-choi, Rúcula, Raps	Chinche pintada (<i>Bagrada hilaris</i>)	250 cc/ha	Puede ser aplicado 2 veces durante la temporada, inmediatamente después del trasplante, desde 4 a 6 hojas verdaderas, o después de la emergencia del cultivo. Utilizar un mojamiento de 200 – 600 L/ha, con un período de protección de 10 días.
Achicoria industrial	Cuncunillas: <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Copitarsia turbata</i> , <i>Rachiplusia nu</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia unipuncta</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Plusia spp.</i> ; Pilme: <i>Epicauta pilme</i> ; Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>A. gossypii</i> ; Larvas minadoras: <i>Liriomyza huidobrensis</i> ; Langostinos: <i>Empoasca curveola</i> , <i>Parathanus exitiosus</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Utilizar la dosis mayor en situaciones de alta presión de plagas. Aplicar hasta 2 veces por temporada, a intervalos de entre 10 y 30 días, con un mínimo de 100 L de agua/ha, dependiendo del equipo de aplicación, tipo de cultivo y estado fenológico.
Pinos	Polilla del brote: <i>Rhyacionia buoliana</i> .	50 (cc/hL)	Aplicar en viveros cuando se detecten los primeros vuelos de adultos. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada a intervalos de entre 7 a 21 días.
Praderas (ballicas, festucas, avena, pasto ovillo y miel, trébol blanco y rosado, <i>Vicia</i> y alfalfa)	Cuncunilla negra: <i>Dalaca spp.</i>	150 - 200 cc/ha	Aplicar temprano en la temporada, con larvas de 0,5 – 1 cm de largo en praderas talajeada o después de un corte, con altura máxima de 5 – 10 cm. Utilizar la dosis más alta en casos de alta presión de la plaga y la dosis más baja con baja presión. Utilizar un mojamiento de 600 L de agua/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada, con un intervalo de 10 a 30 días.

Cuadro de Instrucciones de Uso para Aplicación Aérea

Cultivos	Plagas	Dosis	Observaciones
Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale	Cuncunillas: <i>Dalaca spp.</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia spp.</i> ; Pulgones: <i>Myzus persicae</i> , <i>Ropalosiphum padi</i> , <i>Diuraphis noxia</i> , <i>Macrosiphum avenae.</i> , <i>Schizaphis graminum</i> .	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Máximo 3 aplicaciones en la temporada, separadas 10 a 30 días. Mojamiento mínimo de 40 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico del cultivo.
Maíz	Gusano del choclo: <i>Helicoverpa zea</i>	200 - 250 cc/ha	Aplicar al observar los primeros adultos. Utilizar dosis mayor bajo alta presión de la plaga. Aplicar hasta 4 veces por temporada, separadas 10 a 30 días, con mínimo de 40 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico del cultivo.
Raps, Remolacha, Maravilla	Cuncunillas: <i>Plutella xylostella</i> , <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Agrotis spp.</i> , <i>Copitarsia spp.</i> , <i>Rachiplusia nu</i> , <i>Strigania lithophilus</i> , <i>Pseudaletia unipuncta</i> , <i>Helicoverpa virescens</i> , <i>Plusia spp.</i> ; Pilmes: <i>Epicauta pilme</i> ; Pulgones: <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis brassicae</i> , <i>A. fabae</i> , <i>A. gossypii</i> ; Larvas minadoras: <i>Liriomyza huidobrensis</i> ; Langostinos: <i>Empoasca curveola</i> , <i>Parathanus exitiosus</i>	150 - 200 cc/ha	Aplicar al observar los primeros insectos. Utilizar dosis mayor bajo alta presión de las plagas. Máximo 2 aplicaciones por temporada, separadas 10 a 30 días, con mínimo de 40 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico.
Pinos	Polilla del brote: <i>Rhyacionia buoliana</i>	150 cc/ha	Aplicar en viveros cuando se detecten los primeros vuelos de adultos. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada a intervalos de entre 7 y 21 días. Utilizar 12 L agua/ha.
Praderas (ballicas, festucas, avena, pasto ovillo, pasto miel, trébol blanco, trébol rosado, <i>Vicia</i> , alfalfa)	Cuncunilla negra: <i>Dalaca spp.</i>	150-200 cc/ha	Aplicar temprano en la temporada, con larvas de 0,5 – 1 cm de largo en praderas talajeada o después de un corte, con altura máxima de 5 – 10 cm. Utilizar la dosis más alta en casos de alta presión de la plaga y la dosis más baja con baja presión. Utilizar un mojamiento de 40 L de agua/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada, con un intervalo de 10 a 30 días.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada de **Invicto® 50 CS**, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.

MODO DE APLICACIÓN:

Invicto® 50 CS se puede aplicar con equipo terrestre o aéreo de alto o bajo volumen, asegurando un buen cubrimiento del follaje del cultivo. No aplicar con viento superior a 10 km/h para evitar la deriva, a horas de calor, ni cuando se pronostican lluvias dentro de hasta 6 horas. Utilizar la dosis menor con baja presión de la plaga y la dosis mayor en casos de presión media a alta.

COMPATIBILIDAD: **Invicto® 50 CS** es compatible con una amplia gama de plaguicidas de uso común, si existen dudas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad bajo la responsabilidad del usuario.

INCOMPATIBILIDAD: **Invicto® 50 CS** no debe ser mezclado con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: **Invicto® 50 CS** no presenta problemas conocidos de fitotoxicidad si es utilizado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

EFFECTO SOBRE EL CULTIVO SIGUIENTE: **Invicto® 50 CS** no presenta efectos sobre cultivos siguientes.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda no ingresar hasta 12 horas después de realizada la aplicación. El período de reingreso de los animales debe realizarse 5 días después de realizada la aplicación.

PERÍODOS DE CARENCIA:

Achicoria industrial (raíz): **1 día**; Uva de mesa, Uva pisquera, Vid vinífera, Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora, Zarparrilla, Pluot, Plumcot: **2 días**; Lechuga, Achicoria, Brócoli, Coliflor, Arveja, Haba: **3 días**; Melón, Sandía, Zapallo, Pepino, Tomate, Pimiento, Acelga, Espinaca, Pak-choi, Repollo, Repollo de Bruselas, Praderas (ballicas, festucas, avena, pasto ovillo, pasto miel, trébol blanco, trébol rosado, *Vicia*, alfalfa): **5 días**; Damasco, Durazno, Nectarino, Cíueto Cerezo, Zanañoria, Betarraga, Remolacha, Papa: **7 días**; Palto: **10 días**; Guindo, Almendro, Nogal: **13 días**; Cebolla, Ajo: **14 días**; Manzana, Pera, Membrillo, Poroto, Lenteja, Rúcula, Kale: **20 días**; Maíz: **21 días**; Avena, Trigo, Cebada, Centeno, Triticale, Soya, Raps: **30 días**; Maravilla: **45 días**. Para pinos no corresponde fijar carencias.

OTRAS INFORMACIONES:

Para prevenir o retrasar la aparición de resistencia, no se deben aplicar más de tres o cuatro pulverizaciones por temporada de **Invicto® 50 CS** o de otros insecticidas con igual modo de acción. Si se realizan aplicaciones consecutivas de **Invicto® 50 CS**, entonces debe ser seguido, por lo menos, del mismo número de aplicaciones de insecticida(s) de un grupo diferente(s) antes de volver a utilizarlo nuevamente.

- **No aplicar durante la floración de ningún cultivo, frutal, maleza ni vegetación colindante.**

- **Retirar las colmenas previo a la aplicación y no regresarlas al área de tratamiento antes de 48 a 72 horas después de la aplicación.**

- **Aplicar al atardecer, temprano en la mañana, en horarios de baja actividad de las abejas, evitando la deriva.**

- **Se recomienda, antes de aplicar el producto, eliminar las malezas que están en floración al momento de la aplicación y/o cortar la cubierta vegetal presente alrededor del cultivo.**

- **Se debe notificar a los apicultores ubicados en un radio de mínimo 3 kilómetros de la zona de tratamiento, al menos 72 horas previo a la aplicación con el fin de aplicar medidas de seguridad para sus abejas**