

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: miclobutanilo pertenece al grupo químico de los Triazoles.
No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal: durante la preparación usar de protección protector facial, delantal impermeable, botas de goma y guantes impermeables.
Equipo de protección personal durante la aplicación, usar de protección, overol impermeable, botas de goma, guantes impermeables, antiparras y máscara con filtro.
No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos.
Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

Información ecotoxicológica: Miclobutanil 40% WP, es moderadamente tóxico a organismos acuáticos y peces, ligeramente tóxico a aves y virtualmente no tóxico a abejas.

Síntomas de intoxicación: náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas, cefalea, dolor abdominal.

Antídoto: sin antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco o alejado del lugar de exposición. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Consulte a un médico.

En caso de contacto con la piel: sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si los síntomas persisten acudir a un médico especialista.

En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. De ser necesario consiga ayuda médica inmediatamente. En todos los casos se debe llevar la etiqueta al centro de atención médica.

En caso de ingestión: no inducir vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Consiga ayuda médica inmediatamente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

En caso de intoxicación llamar :
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC)
teléfono: 56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

MICLOBUTANIL 40% WP

Fungicida
Polvo Mojable (WP)

Miclobutanil 40% WP es un fungicida sistémico, preventivo, recomendado para el control de enfermedades foliares y de los frutos de los cultivos citados en el Cuadro de Instrucciones de Uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo	% p/p
Miclobutanilo*	40% p/p (400 g/kg)
Coformulantes, c.s.p.:	100% p/p (1 kg)

*(RS)-2-p-clorofenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexanonitrilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2661

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Fabricado y distribuido por:

Agrospec

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción:

Miclobutanil 40% WP es un fungicida de la familia de los triazoles, sistémico, con acción preventiva y de contacto.

Equipo de aplicación: pulverizador.

Preparación de la mezcla: para cada una de las aplicaciones, realizar la dilución en agua, agregando Miclobutanil 40% WP al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, para luego completar con agua el estanque y aplicar.

Cuadro de instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis*	Observaciones	Carencias (días)
Vides	Oídio <i>Uncinula necator</i>	7,5 g/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con brotes de 5 - 10 cm de largo, repetir cada 10 - 12 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L de agua/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	10
Manzano Peral	Venturia <i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i>	7,5 - 10 g/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones en puntas verdes, repitiendo cada 7 a 10 días o según condiciones. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L de agua/ha. Presenta 96 h de efecto retroactivo. Aplicaciones por temporada: 3.	Manzano: 10 Peral: 7
Manzano	Oídio <i>Podosphaera leucotricha</i>	10 - 12,5 g/100 L de agua	Iniciar en caída de pétalos, y repetir mientras sea necesario cada 10 - 14 días. Mojamiento sugerido: 2.000 L de agua/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	10
Duraznero Nectarino	Oídio <i>Sphaerotheca pannosa</i>	8 - 10 g/100 L de agua	Aplicar con fruto tamaño arveja o al presentarse los primeros síntomas. Repetir cada 15 días hasta endurecimiento del carozo.	3
	Tizón de la flor <i>Monilia laxa</i>	250 - 300 g/ha	Primera aplicación con botón rosado y repetir si fuera necesario en caso de lluvia. Mojamiento sugerido: 2.000 L de agua/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	
Pimiento Tomate	Oídio <i>Erysiphe polygoni</i>	75 - 120 g/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos, a medida que crece el cultivo aumentar las dosis de aplicación. Mojamiento sugerido: 200 - 300 L de agua/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	Pimiento: 3 Tomate: 10
Remolacha	Oídio <i>Erysiphe polygoni</i>	125 - 150 g/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Aplicaciones por temporada: 2.	28
Melón Sandía Zapallo	Oídio <i>Erysiphe cichoracearum</i>	80 - 100 g/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento sugerido: 500 L de agua/ha. Aplicaciones por temporada: 2.	3

* Utilizar siempre las dosis menores recomendadas, y en condiciones de alta presión de enfermedad, utilizar dosis mayores.

Precaución: para evitar problemas de resistencia, intercalar con productos de distinto modo de acción. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), y no aplicar con altas T° (mayores a 28°C).


Fitotoxicidad: no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común.

Incompatibilidad: incompatible con los pesticidas de reacción alcalina o con Caldo Bordolés y Polisulfuro de Calcio. Si se utiliza en mezcla con otros pesticidas se recomienda realizar prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de cada aplicación.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación para personas. Para animales no corresponde por ser un cultivo no destinado a la alimentación animal.

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

