

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: PACLOT es un producto en base a Paclobutrazol perteneciente al grupo químico de los triazoles.

Durante su preparación: usar guantes impermeables, máscara con filtro y antiparras, botas de goma y delantal impermeable. **Durante la aplicación:** usar guantes impermeables, máscara con filtro, antiparras, botas de goma y delantal impermeable. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. **PACLOT** no diluido puede irritar los ojos y la piel. No respirar el producto concentrado ni la neblina de pulverización. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar a un médico de inmediato. Después de su manejo lavarse las manos y cara con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar e ir al baño. Lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar a parte la ropa y el equipo usado.

Información Ecotoxicológica: PACLOT es ligeramente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves, y virtualmente no tóxico para abejas.

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<<EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO>>

<<PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Instrucciones para el Triple lavado de los envases:

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Síntomas de Intoxicación: Irritación de ojos, piel, mucosas, dificultad para respirar, náuseas, vómitos.

PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos, que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar al afectado inmediatamente al Centro Asistencial para tratamiento inmediato.

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Obtenga atención médica.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua de la llave por 15 a 20 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el lavado de los ojos, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente, si la irritación persiste, consultar con un especialista.

Tratamiento Médico de Emergencia: Sintomático.

Antídoto: No tiene antídoto específico

Teléfonos de Emergencia: RITA CHILE: 22777 1994.

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Almacenar el producto en su envase original con la respectiva etiqueta, en lugar, seguro, fresco y seco, separado de alimentos, herbicidas, forrajes y fertilizantes.

PACLOT

FITORREGULADOR SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

PACLOT es un fitorregulador sistémico. En árboles frutales aumenta la cantidad de yemas florales e induce una proporción mayor de ramilletes florales en la parte inferior del árbol, aumentando la cantidad de frutos cuajados. Reduce el largo de los entrenudos y la producción de brotes laterales, disminuyendo los requerimientos de poda. Adelanta la madurez de la fruta (4 a 5 días) y concentra el período de cosecha, mejorando el color y la calidad. De acuerdo con lo señalado en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

Paclobutrazol*25% p/v (250 g/L)
Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1 L)

*(2RS,3RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-1-ol.

AUTORIZACIÓN SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO Nº 4.259

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO>>

Lote Nº:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Fabricado por:

PROPLAN Plant Protection Company, S.L.
c/ Valle del Roncal, 12 1ª planta – oficina 7
28232 Las Rozas, Madrid
España

CIECH SARZYNA S.A.

ul. Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna
Polonia

Importado y Distribuido por:



Avda. Presidente Kennedy 5749, oficina 3702,
Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2202 5944
e-mail: agro@agroconnexion.cl

INSTRUCCIONES DE USO

PACLOT es un fitorregulador que aumenta la productividad y calidad de la fruta de huertos comerciales. De acuerdo con lo señalado en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Modo de Aplicación
Duraznero, Nectarino	2,0 a 2,4	Aplicación a árboles con riego por surco: Abrir un surco profundo en el sitio exacto del surco de riego hasta llegar a las primeras raíces. Aplicar PACLOT diluido en agua y al fondo del surco. Calcular la dosis necesaria por planta y aplicarla diluida en 1 a 2 litros de agua por árbol. Luego, cubrir y compactar el fondo del surco con 5 a 10 cm de suelo. Aplicar una sola vez por temporada, entre junio y agosto. Se recomienda utilizar la dosis superior en suelos más pesados y la inferior en suelos más livianos.
	0,8 a 1,2	Aplicación a árboles con riego por goteo: Aplicación manual: Aplicar en el lugar del gotero la cantidad de PACLOT calculada por planta, diluida en 1,25 litros de agua. Aplicación a través de las líneas de riego: Aplicar procurando que el producto quede uniformemente distribuido. Aplicar una sola vez por temporada, preferentemente entre junio y agosto. Se recomienda utilizar la dosis superior en suelos más pesados y la inferior en suelos más livianos.
Nogal	1,0	Aplicación con riego por goteo o microaspersión: Aplicar procurando que el producto quede uniformemente distribuido. Aplicación mediante inyección en la zona de raíces: Preparar una solución de PACLOT más agua (ej.: para 100 árboles por ha, es decir, para una plantación a 10 x 10 m, preparar 1 litro de PACLOT en 400 litros de agua y aplicar 4 litros de esta solución por planta. Para 200 árboles por ha, aplicar 2 litros de la solución por planta. Aplicar una sola vez por temporada, entre junio y agosto, en suelo libre de malezas. Utilizar en árboles con exceso de vigor y para aquellos que se les quiere controlar el vigor.
Palto	3,0-5,0	Aplicación foliar: En primavera, dirigida a las panículas florales, sobre plantas adultas vigorosas. En verano - otoño dirigida hacia los rebrotes de poda. Asegurar un adecuado cubrimiento de la periferia de las plantas con un volumen de agua de 300-500 L/ha. La fruta de la temporada debe haber sido cosechada antes de la aplicación. Aplicación aérea: En primavera, dirigida a las panículas florales, sobre plantas adultas vigorosas. En verano - otoño dirigida hacia los rebrotes de poda. Asegurar un adecuado cubrimiento de la periferia de las plantas con un volumen de agua mínimo de 60 L/ha. La fruta de la temporada debe haber sido cosechada antes de la aplicación. Utilizar la dosis mayor dependiendo del tamaño y vigor de las plantas, considerando la carga floral de los distintos huertos. Para mayores detalles, favor comunicarse con nuestro Departamento Técnico.

Notas Importantes:

DURAZNERO, NECTARINO, NOGAL:

- En aplicaciones dirigidas al suelo, regar después de la aplicación. El riego debe practicarse de la forma más eficaz en términos de profundidad y frecuencia.

- El raleo se debe realizar con exactitud según la práctica normal, ya que cuajará una mayor cantidad de fruta.

Método de preparar la mezcla: En el caso de aplicaciones manuales al suelo, preparar una solución, de acuerdo a lo indicado en el cuadro de instrucciones de uso. En el caso de paltos, **PACLOT** se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar con agua, completando luego el volumen total de agua con agitación constante.

Incompatibilidad: Debido a la naturaleza de la aplicación, no es recomendable aplicar **PACLOT** en mezcla con otros productos.

Fitotoxicidad: No aplicar **PACLOT** por lo menos 3 años antes de un replante de huerto. Al renovar árboles en el huerto, siempre debe reemplazarse el suelo alrededor del árbol por suelo no tratado.

Periodo de Carencia: Palto, Durazno, Nectarino y Nogal: 100 días. Una vez cumplida la carencia nacional, para el caso de fruta de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso (personas y animales): En aplicaciones al suelo, no ingresar al área tratada hasta que el tratamiento se haya cubierto con suelo. En el caso de paltos, no ingresar al área tratada hasta 1 hora después de la aplicación o bien cuando la aspersión se haya secado, a menos que se vista ropa de protección. No corresponde indicar período de reingreso para animales, pues el objetivo productivo del cultivo no es alimentación animal (pastoreo).

Nota: El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza de acuerdo con su recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar su uso inadecuado ya sea por mal manejo del almacenamiento y/o mala manipulación de los envases y/o trasvasijos.



NOCIVO