

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Quizalofop-p-tefurilo pertenece al grupo químico de los ariloxifenoxipropionatos. No fumar, comer o beber durante el uso de este producto. Destinar un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible, después de la aplicación lavar muy bien el equipo antes de usarlo para otros fines. Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la manipulación:** usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y delantal impermeable. **Durante la preparación de la mezcla y la carga del equipo de aplicación,** usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y delantal impermeable. **Durante la aplicación:** usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y overol impermeable. Alejar los animales domésticos y personas extrañas. No trabajar en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplicar con viento de más de 5 kph. No aplicar directamente a corriente de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño. o después del trabajo.

Riesgos ambientales: PANTERA® PLUS no tóxico para abejas, ni aves y es moderadamente tóxico a peces. No contaminar cursos de agua.

Síntomas de intoxicación: Depresión respiratoria, convulsiones, probable daño a las membranas mucosas. **Primeros Auxilios:** En caso de **Contacto con los ojos:** Lavarlos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Acudir al médico. **Contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con abundante agua de la llave: Retirar ropa y zapatos. Quitarse y lavar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Acudir al médico. **Inhalación:** Proporcionar aire fresco y reposo. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar ayuda médica. **Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Trasladar al afectado a un centro asistencial donde pueda recibir asistencia médica profesional.

Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de ingestión sólo inducir el vómito de acuerdo a las instrucciones del médico. Puede ser necesario realizar lavado gástrico, con cuidado para impedir la aspiración de los contenidos gástricos. El tratamiento posterior es sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Instrucciones para el triple lavado: **Paso 1:** Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos. Asegúrese de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA, o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500, Santiago, Chile.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTRO QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.



Nota N°: Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.345

PANTERA® PLUS, herbicida selectivo post emergente de acción sistémica, para el control de malezas gramíneas (anuales y perennes), en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:
 Quizalofop-p-tefurilo * 3 % p/v (30 g/L)
 Cofomulantes c.s.p. 100% p/v (1L)
 *(R-2-[4-(6-cloroquinaxalin-2-iloxi) fenoxi]propionato de (RS)-tetrahidrofurfurilo (2,4% p/v (24 g/L) de equivalente ácido de Quizalofop-P).

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Cont. Neto: Litro

Importa y Distribuye:
Arysta LifeScience Chile S.A.
 El Rosal 4610, Huechuraba,
 Santiago, Chile
 ET3345V-005-XX
 OS1

Fabricado por:

LAOTING YOLOO BIO-TECHNOLOGY CO. LTD. No. A-3, Tianjin Road, Laoting Economic Development Zone, Hebei Province, 063600, China. **LANXESS SOLUTIONS US Inc.**, 214 West Ruby Avenue, NC 28054 - 2337, Gastonia-Estados Unidos; **UPL ARGENTINA,** Av. de los Lagos 6855, Buenos Aires - Argentina; **AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.,** Calle Norte 5 s/n Esq. con Av. José Escandon, Ciudad Industrial, C.P.87499 - México; **AGRICULTURA NACIONAL S.A. DE C.V.,** Km. 5 Carretera las bocas s/n, Izúcar de Matamorros, Pue. C.P. 74400 - México; **REOPEN S.A.,** Rio Derey s/n, Gral. Rodríguez (1748), Buenos Aires - Argentina

INSTRUCCIONES DE USO:

PANTERA® PLUS es un herbicida selectivo post-emergente de acción sistémica para el control de las malezas gramíneas anuales y perennes especificadas y para los cultivos también indicados en el cuadro de Instrucciones de uso. **PANTERA® PLUS** es absorbido por las hojas de las malezas y por su acción sistémica es movilizado a todos los puntos de crecimiento. Se acumula en las zonas meristemáticas de tallos, rizomas y raíces donde cumple su efecto herbicida, deteniendo el crecimiento de las malezas susceptibles. **PANTERA® PLUS** es un producto listo para usar y no requiere ser mezclado con aceite.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES (*)
Manzano, Peral, Nopal, Duraznero, Nectarino, Ciruelo, Naranja, Limonero, Kiwi, Vides, Papas, Tomates, Raps, Maravilla, Remolacha, Alfalfa, Lupino, Frejol, Poroto, Pino Insigne, Eucalipto.	Avenilla (<i>Avena fatua</i>), Avena (<i>Avena sativa</i>), Trigo (<i>Triticum sp.</i>), Ballica (<i>Lolium multiflorum</i>), Cebadilla (<i>Citrisolium murium</i>), Hualcacho (<i>Echinochloa c.</i>), Pega-pega (<i>Setaria verticillata</i>), Cola de Zorro (<i>Cynosorus echinatus</i>)	1,5 a 1,75	Aplicar cuando las malezas tienen entre 5 a 10 cm de altura. Mojamiento 200 Litros/ha.
	Pasto cebolla (<i>Arrhenatherum elatius</i>) y Chépica (<i>Agrostis sp.</i>)	1,75 a 2,0	Aplicar cuando las malezas tienen entre 10 a 20 cm de altura. Mojamiento 200 Litros/ha.
	Maicillo (<i>Sorghum halepense</i>) y Chépica (<i>Paspalum sp.</i>)	2,5 a 3,0	Aplicar cuando el Maicillo tenga 15 a 20 cm de altura y la Chépica tenga estolones de 10 a 20 cm de largo. Mojamiento 200 Litros/ha.
	Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	7,0 a 8,0	Aplicar cuando los estolones tengan 10 a 20 cm de largo. Mojamiento 200 Litros/ha.
Vides	Ballica (<i>Lolium multiflorum</i>)	2,5 a 3,5	Una aplicación. Dosis Menor: desde 5 a 10 cm de altura con mojamiento de 220 Litros/ha. Dosis Mayor: Sobre 10 cm de altura con mojamiento de 300 Litros/ha.

(*) Emplear dosis mayores en condiciones de baja humedad en suelo, sobre malezas desarrolladas o en cultivo sin preparación de suelo (ejemplos: cero labranza, sobre hileras forestales o frutales). Para obtener mayor eficacia, **PANTERA® PLUS** siempre debe ser aplicado cuando las malezas estén en crecimiento activo. Realizar sólo una aplicación por temporada. **Preparación de la mezcla:** Poner agua en el estanque hasta la mitad. Poner en movimiento el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria del producto y luego completar con agua a volumen total con agitación constante.

Incompatibilidades: Se recomienda aplicar **PANTERA® PLUS** de preferencia solo. En caso de mezclas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: **PANTERA® PLUS** no es fitotóxico en los cultivos recomendados.

Periodo de carencia: **PANTERA® PLUS** no tiene restricciones de carencia.

Tiempo de reingreso al área tratada: Tanto para personas como para animales se puede reingresar al área tratada 1 hora después de la aplicación.

Resistencia: El uso exclusivo y repetido de este producto puede conducir a la selección y desarrollo de mezclas resistentes a este herbicida. Para prevenir el desarrollo de resistencia, se recomienda mezclarlo o alternarlo con herbicidas de diferente modo de acción, empleando las dosis y épocas de aplicación recomendadas en la etiqueta.

Condiciones para una aplicación segura y eficaz: No aplicar con viento de más de 5 kph, ni cuando se esperen lluvias dentro de las 3 horas siguientes. Evitar aplicación con rocío. No aplicar en condiciones de sequía. No usar producto preparado del día anterior. En áreas irrigadas aplicar inmediatamente después del riego. No aplicar en cultivos en condiciones de estrés. Es conveniente no escardillar el cultivo antes de la aplicación. Es necesario escardillar el cultivo 5 a 7 días después de la aplicación.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustraes de nuestro control directo.

***PANTERA** es Marca Registrada



CUIDADO



PANTONE 347 C

NEGRO