

PUNTO® 35 SC

INSECTICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°1.624

PUNTO® 35 SC, insecticida sistémico especialmente indicado para el control de los insectos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid (*)	35 % p/v (350 g/l)
Cofomulantes c.s.p.	100 % p/v (1 l)
(*) 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina.	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA – CHILE

GLEBA S.A.

Avda. 520 y Ruta Provincial 36 (1903) Melchor Romero
La Plata, Buenos Aires Argentina

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China. ZIP: 324400

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

PUNTO® 35 SC, es un insecticida, cuyo ingrediente activo imidacloprid pertenece al grupo químico de los neonicotinoides. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación bañarse y cambiarse de ropa. Lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

<< ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO APLICAR EN FLORACIÓN >>

PUNTO® 35 SC, es prácticamente no tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Moderadamente tóxico para aves y altamente tóxico a abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para Triple Lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** En caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación: Fatiga, calambres, dificultad para respirar. Irritación dermal y ocular.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. **En caso de contacto ocular:** Lavar con agua fría, limpia y corriente por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirar los lentes y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco, tenderlo y abrigarlo. **En caso de ingestión:** NO PROVOCAR VÓMITOS. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos:** Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial llevando copia de la etiqueta.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **PUNTO® 35 SC** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

© Marca registrada por AGRICOLA NACIONAL S.A.C. E.I.



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

PUNTO® 35 SC, insecticida sistémico especialmente indicado para el control de los insectos descritos en el cuadro de instrucciones de uso

Cuadro de Instrucciones de uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Vid	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i> ; <i>P. rubigena</i> , <i>P. cribata</i> , <i>P. longispinus</i> .)	1.2 – 2.5 L/ha (2 cc/planta)	<u>Aplicación vía riego tecnificado:</u> Distribuir la dosis en función de la densidad de plantación y número de goteros. Realizar monitoreo de la plaga y aplicar al detectar los primeros movimientos de ninfas, temprano en la temporada, con brotes de 15 – 45 cm. Utilizar dosis alta con historial de fuerte presión de la plaga o de alta infestación. Las raíces absorbentes deben estar en plena actividad y debe existir una adecuada condición de humedad en el suelo para lograr una óptima absorción por parte de la planta. Aplicar en el transcurso de un riego habitual, aproximadamente en el tercio medio del total de riego. Agitar constantemente la mezcla mientras se inyecta al sistema.	15
		50 – 60 cc/100 L de agua	Aplicación foliar: inmediatamente post-cuaja. Realizar monitoreo para detectar movimiento de ninfas. No debe distanciarse más allá de 45 días de la aplicación al riego. Efectuar 2 aplicaciones separadas cada 15 días si no hubo aplicación al riego.	
Vid, Duraznero, Nectarino	Pulgón de la uva (<i>Aphis illinoensis</i>) Pulgón verde del duraznero (<i>Myzus persicae</i>) Pulgón negro del duraznero (<i>Brachicaudus persicae</i>)	20 – 30 cc/100 L de agua	Aplicar al follaje hasta antes de floración.	Vid, Nectarín 15 Duraznero 20
Manzano	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i> y <i>Pseudococcus calceolarie</i>)	60 g/hL	Aplicar según monitoreo de la plaga, al observar los primeros ejemplares con un volumen de agua que permita un buen cubrimiento.	21
Tomate de invernadero	Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	Riego por goteo o cinta: 0,03-0,04 cc/planta	En almácigos regar con una solución de 0.5 L de agua. También aplicar en el hoyo de la plantación al momento del trasplante.	3
		0.8-1.2 L/ha	<u>Aplicación al riego:</u> La dosificación por hectárea está dada para plantaciones con densidades de 28 a 34.000 plantas de tomate. En almácigos regar con una solución de 0.5 L de agua. También aplicar en el hoyo de la plantación al momento del trasplante.	
		40-60 cc/100L agua	<u>Aplicación al follaje:</u> Aplicación foliar temprana, al aparecer los primeros individuos.	
Limonero	Mosquita blanca de los citrus, mosquita blanca algodonosa.	40 – 60 cc/100 L de agua	Aplicación foliar al aparecer la plaga, mojado abundantemente y con alta presión.	21

Instrucciones de uso:

•ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO APLICAR EN FLORACIÓN, RETIRAR COLMENAS DEL ÁREA A TRATAR PREVIO A LA APLICACIÓN.

- No aplicar ante la posibilidad de lluvias, o después de lluvias recientes o en condiciones de alta humedad en el medio de desarrollo de la planta.
- No aplicar el producto durante floración.
- Aplicación manual mediante monitoreo de la plaga, al observar movimiento de los primeros insectos.
- Realizar como máximo 1 vez por temporada en tomate y manzano, para el resto de los cultivos aplicar un máximo de 3 aplicaciones por temporada, con intervalo de 20 días.
- Aplicación al suelo vía riego tecnificado al detectar los primeros movimientos de insectos sobre las plantas. Aplicar una vez en la temporada. Aplicar con raíces en plena actividad para asegurar la absorción del producto. Inyectar el producto en el equipo de riego en el tercio medio del tiempo total de riego.
- Mojamientos recomendados durazno, nectarín 1000 a 1500 L/ha. Vides y manzana 1500 a 2000 L/ha. Limón 2000 a 3000 L/ha.

Tomate 400 a 800 L/ha.

- Aplicar dosis menor con baja presión de la plaga y dosis mayor con presiones media a altas.

Preparación de la mezcla: Llenar el equipo pulverizador hasta la mitad con agua, manteniendo el agitador en marcha. Agregar **PUNTO® 35 SC** en la dosis requerida, luego completar el volumen de agua según la capacidad, manteniendo agitación constante, para lograr una solución homogénea.

Compatibilidad: **Punto® 35 SC** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: **Punto® 35 SC** es incompatible con productos de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se siguen las instrucciones de uso.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



NOCIVO

