

## SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

**Área Cuarentenada:** Es un área de riesgo que se define al detectar presencia de la plaga. Si su casa se encuentra dentro de esta área es altamente probable que la tenga presente en su parronal.

**Casa Positiva:** Es aquel lugar donde se detectan ejemplares de polilla del racimo, en alguna inspección realizada por el SAG.

**¿ Cómo saber si mi casa está en el Área Cuarentenada ?**

**¿ Cómo saber si mi casa es positiva para polilla del racimo ?**

**Un inspector del SAG lo notificará en su hogar y le dará las pautas que tiene que seguir.**

**Ante cualquier duda comuníquese con inspectores SAG, llámenos al Call Center 600 8181724 o envíenos un correo electrónico, dependiendo de su región a :**

[controloficial.atacama@sag.gob.cl](mailto:controloficial.atacama@sag.gob.cl)

[controloficial.coquimbo@sag.gob.cl](mailto:controloficial.coquimbo@sag.gob.cl)

[controloficial.valpo@sag.gob.cl](mailto:controloficial.valpo@sag.gob.cl)

[controloficial.rm@sag.gob.cl](mailto:controloficial.rm@sag.gob.cl)

[controloficial.ohiggins@sag.gob.cl](mailto:controloficial.ohiggins@sag.gob.cl)

[controloficial.maule@sag.gob.cl](mailto:controloficial.maule@sag.gob.cl)

[controloficial.biobio@sag.gob.cl](mailto:controloficial.biobio@sag.gob.cl)

**Medidas que usted debe adoptar para controlar la polilla del racimo en su hogar si su casa está situada en el Area Cuarentenada o si el SAG detectó presencia de esta polilla en su casa:**

### MEDIDAS PRIMAVERA - VERANO

- Eliminar y destruir **todos** los racimos florales.
- Está prohibido movilizar frutos o partes de la planta fuera de la casa.
- Si usted está de acuerdo, el SAG cuenta con personal capacitado para la eliminación de parras de su domicilio sin costo.

### MEDIDAS OTOÑO - INVIERNO

- Cortar y destruir la fruta que aún permanece en las plantas.
- Podar el parronal y destruir la madera. Sacar y destruir la corteza de las plantas de vid.
- Está prohibido mover los restos de la poda y los restos de descortezado de las plantas fuera de la casa.
- Enterrar o quemar todo el material dentro del domicilio, en los plazos indicados por el SAG.
- Si está de acuerdo, el SAG cuenta con personal capacitado para la eliminación de las parras de su domicilio, sin costo para usted.

CHILE  
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
SAG

**EN EL PARRÓN DE SU CASA PUEDE TENER UNA VISITA INESPERADA**



**LA POLILLA del RACIMO,**

*Lobesia botrana*

**¡ Si la encuentra, avísenos !**

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

## ¿Qué es la polilla del racimo?

La polilla del racimo o *Lobesia botrana* es un insecto cuya larva se alimenta del racimo de uva. Este insecto provoca daño directo, al alimentarse de los racimos, los cuales posteriormente se pudren y/o deshidratan, si no se toman las medidas de control. Esta plaga causa graves pérdidas en la producción de uva de mesa para consumo y para la exportación. Además, afecta de forma importante a las vides para la producción de vinos. Estos rubros son de suma importancia para nuestro país, por lo que su ayuda es fundamental para lograr erradicar esta plaga.

tamaño real: 7mm



Conózcala y detéctela en su parronal de acuerdo a la época del año:

### PRIMAVERA

- Las larvas de la polilla unen flores y frutos pequeños mediante hilos de seda blancos.



### FINES DE PRIMAVERA - VERANO

- Las bayas (granos) se encuentran perforadas, podridas o secas.
- Presencia de abundante seda y fecas de la polilla en racimos.
- Larvas dentro del racimo protegiéndose con seda blancas que ella producen.



foto: gentileza de Singenta

### FINES DE VERANO - OTOÑO

- Racimos con bayas (granos) de uva deshidratados.
- Gran cantidad de fecas de larvas de la polilla
- Larvas al interior de las bayas (granos) o entre el racimo, ocultos dentro de los capullos de seda blanca.



### INVIERNO

- Pupas bajo la corteza de unos 5mm, cubiertas de capullo algodonoso.

