

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Flutriafol pertenece al grupo químico de los triazoles. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. No almacene las semillas tratadas de un año para otro. No manipule innecesariamente la semilla tratada. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación y aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal Impermeable, protector facial. Durante la preparación y aplicación, aleje los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica. Lavarse prolijamente con abundante agua que escurra antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo. **NO DESTINAR LAS SEMILLAS TRATADAS PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios: En caso de **Contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar al médico si persiste irritación. En caso de **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si las molestias persisten acudir a un médico. En caso de **Inhalación:** traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de **Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general poner al afectado de costado. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento.

Tratamiento médico de emergencia: Observe al paciente y trate sintomáticamente. En caso de ingestión, si el lavado gástrico es considerado necesario, prevenga la aspiración del contenido gástrico. **Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: Vincit® Flo, es de baja toxicidad para mamíferos, aves, peces y lombrices.

EL PRODUCTO ES MUY TÓXICO PARA ABEJAS.

DEBE DAR AVISO A LOS APICULTORES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁREA DE APLICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE LA APLICACIÓN. APLICAR EN HORARIOS DE BAJA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS, COMO TEMPRANO EN LA MAÑANA O AL ATARDECER.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL".

"NO DESTINAR LAS SEMILLAS TRATADAS PARA CONSUMO ANIMAL." "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Instrucciones para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.
3. eliminar de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.

Teléfonos de emergencia: CITUC : (56 2) 2635 3800. FMC Química Chile Ltda.: (56 2) 2820 4200

VINCIT® FLO

FUNGICIDA

SUSPENSION CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (FS)

Fungicida sistémico y de contacto, especialmente indicado para tratamiento de semillas para el control de carbón cubierto y carbón volador en trigo, avena y cebada. También es efectivo en el control de fusarium, septoriosis, helminthosporium y rinosporiosis.

Composición

Flutriafol*	2.5 % p/v (25 g/L)
Coformulantes, c.s.p	100 % p/v (1 L)

*Alcohol (RS)-2,4'-difluoro-a-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ilmetil) benzhidrilico

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2290

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

Lote Nro.:
Fecha de venc:
Contenido Neto:

Fabricado por:
PHYTEUROP S.A.
Rue Pierre My Z.I.
Grande Champagne 49260 Montreuil-
Bellay, Francia
CHEMINOVA Deutschland GmbH&Co.
KG, Stader Elbstrasse 26, D-21683-Stade,
Alemania.

Importado por:
FMC Química Chile Ltda.
Avda. Vitacura 2670, Piso 15
Las Condes, Santiago-Chile

FMC

VINCIT® es marca registrada de CHEMINOVA A/S.

CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO:

Vincit® Flo, fungicida sistémico y de contacto, especialmente indicado para tratamiento de semillas para el control de carbón cubierto (*Tilletia foetida*) y carbón volador (*Ustilago tritici*) en trigo, avena y cebada. También es efectivo en el control de fusarium, septoriosis, helminthosporium y rincosporiosis.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo, Avena, Cebada	Carbón cubierto (<i>Tilletia foetida</i>), Carbón volador (<i>Ustilago tritici</i>), Fusarium (<i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Fusarium culmorum</i>), Septoria (<i>Septoria nodorum</i>), Helminthosporium (<i>Helminthosporium spp.</i>), Rincosporiosis (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	200 cc/100 Kg de semillas	Disolver la dosis indicada en 1 a 2 Lt de agua y luego mezclar en forma homogénea para obtener un óptimo control de las enfermedades. Para ello es recomendable realizar la mezcla de del producto diluido y las semillas en un tambor rotativo excéntrico y hacerlo girar durante 5 a 10 minutos. Las semillas tratadas con Vincit® Flo se deben sembrar en la temporada. 1 aplicación por temporada

Incompatibilidad: Normalmente **Vincit® Flo** no se usa mezclado con otros productos fitosanitarios. En caso de mezclas específicas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: **Vincit® Flo** no es fitotóxico sobre las semillas tratadas cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Tiempo de reingreso: Por la forma de aplicación no corresponde tanto para personas como animales. No alimentar animales una vez tratada la semilla.

Período de carencia: Por la forma de aplicación no corresponde.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

