

AZUFRE LANDIA® AEREO

FUNGICIDA Y ACARICIDA POLVO SECO DP

Fungicida y Acaricida de contacto de acción preventiva indicado para el control de las plagas y enfermedades indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso, en los cultivos especificados en este.

Composición:

Azufre 93 % p/p (930 g/kg)
Coformulantes c.s.p. 100 % p/p (1 Kg)

INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO
"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2073

Fabricado y distribuido por:
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.
Los Yacimientos 1301 • Maipú • Santiago • Chile
Fono: (56-2) 381 27000 • Fax: (56-2) 2381 7191

Lote N°:
Vence:
Contenido neto:
25 Kilos

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

AZUFRE LANDIA® AEREO, es un producto inorgánico, formulado en base a azufre. El azufre pertenece al Grupo Químico de los Calcógenos

- No fumar, comer o beber durante el uso de este producto.
- Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evitar en todo momento el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.

Para su seguridad durante la preparación del producto

- Use mascarilla nariz-boca y guantes de goma.
- No trabaje en la nube que se genera al aplicar el producto. No aplicar con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.

Para su seguridad durante la aplicación del producto

- Use protector facial, mascarilla nariz-boca, overol impermeable, guantes y botas sean de goma.

Para su seguridad después de la aplicación del producto

- Bañarse y lavarse con agua y jabón luego de finalizado el trabajo y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Reemplazar la ropa de trabajo por ropa limpia. Lavar la vestimenta de trabajo.

Síntomas de intoxicación:

- A nivel general, el azufre puede producir irritación de la piel, ojos, pulmones y tracto intestinal, además de ciertas dificultades respiratorias.
- **Inhalación:** Produce tos y sensación de ardor traqueal.

Primeros auxilios:

- **Contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con agua por al menos 15 minutos, si persiste la irritación acudir al médico (oftalmólogo). En caso de utilizar lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos.
- **Contacto con la piel:** lavar en forma acuciosa con abundante agua de la llave, si persiste la irritación o dolor acudir al médico.
- **Ingestión:** en caso de ingestión, llevar a la persona al médico.
- **Inhalación:** conducir a la persona a espacios aireados. Llamar a un médico.

Tratamiento médico de emergencia:

Si la ingestión ha ocurrido en un tiempo inferior a una hora, se puede practicar lavado gástrico con suero fisiológico (15 cc/kg) siempre bajo supervisión médica. Después de la ingestión, está contraindicado producir emesis porque se pueden producir convulsiones.

Antídoto:

administrar carbón activado como adsorbente en dosis de 25 a 100 gramos en adultos y 1 gramo por kilo en niños, acompañado de 10 a 15 cc de lactulosa.

Riesgos ambientales:

AZUFRE LANDIA® AEREO no es peligroso para las abejas, es prácticamente no tóxico para aves, mamíferos y peces.

PARA APLICACIONES AEREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS
EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD
LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS
AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL
NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Marca Registrada de QUIMETAL INDUSTRIAL S.A

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
Centro de información Toxicológica Universidad Católica (CITUC convenio AFIPA): (56-2) 2635 3800
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.: (56-2) 2381 7000

AFIPA



CUIDADO



AZUFRE LANDIA® AEREO

INSTRUCCIONES DE USO
 AZUFRE LANDIA® AEREO está indicado para el control de las plagas y enfermedades indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso, en los cultivos mencionados en este. Sus pequeñas partículas permiten realizar sus cualidades obteniéndose una distribución uniforme y una óptima adherencia sobre la superficie de las hojas, sarmientos y frutos.
Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO	PLAGA / OBJETIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
		Kg/ ha	
Cerezo, Nectarinos, Ciruelo, Damasco	Prevención de arañas (Araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>), Araña bicolada (<i>Tetranychus urticae</i>))	20-25	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de caminos con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
Manzano	Prevención de arañas (Araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>), Araña bicolada (<i>Tetranychus urticae</i>))	20-25	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
Melón, Sandía, Zapallo, Pepino	Araña bicolada (<i>Tetranychus urticae</i>), Prevención de arañas (Araña carmín (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>))	20-30	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días. Repetir no más de 12 veces en la temporada
	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	10-12	Aplicar en forma preventiva o al inicio de la manifestación de síntomas en el follaje. Repetir cada 7-14 días. Tiene efecto colateral sobre arañas. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada
Zapallo Italiano, Alcachofa, Arveja, Frejol	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	10-12	Aplicar en forma preventiva o al inicio de la manifestación de síntomas en el follaje. Repetir cada 7-14 días. Tiene efecto colateral sobre arañas. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada
Naranja, Limonero, Mandarino, Pomelo	Prevención de arañas (Araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>), Acaro ancho (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>), Falsa araña roja de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>)), Prevención del ácaro de la yema (<i>Eriophyes sheldoni</i>)	20-40	Tiene efecto supresor colateral sobre arañas. Monitorear la presencia de araña, sobre todo en sectores con polvo. Aplicar al observar su presencia, comenzando en sectores con antecedentes a orillas de caminos con alta presión de polvo. Repetir cada 10 – 15 días y no más de 12 veces en la temporada.
Paltos	Araña roja del plato (<i>Oligonychus yothersi</i>)	20-40	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de caminos con alta presión de polvo. Desde fines de enero, se debe monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días y no más de 12 veces en la temporada.
Tomate	Eriofido del tomate (<i>Aculops lycopersici</i>)	15-30	Aplicar según condiciones cada 10-15 días, de acuerdo con la presión de la plaga. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	10-12	Aplicar en forma preventiva o al inicio de la manifestación de síntomas en el follaje. Repetir cada 7-14 días. Tiene efecto colateral sobre arañas. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada
Papa	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	10-12	Aplicar según condiciones cada 10-15 días. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada
Remolacha Azucarera	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	5-8	Aplicar en forma preventiva al observar los primeros síntomas. Repetir cada 10-15 días. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada
Rosas, Claveles	Prevención de arañas (Araña bicolada (<i>Tetranychus urticae</i>), Araña carmín (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>))	20-30	Aplicar según condiciones cada 10-15 días, de acuerdo con la presión de la plaga. No aplicar en plena flor. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
Crisantemos, Gladiolos, Rosas	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	10-12	Aplicar según condiciones cada 10-15 días, de acuerdo a la presión de la enfermedad. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada
Parronales - Vid	Prevención de la Erinosis de la vid (<i>Colomerus vitis</i>) Prevención de arañas (Araña roja de la uva de mesa (<i>Oligonychus vitis</i>), Falsa araña roja de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>))	15-20	Tiene efecto supresor colateral sobre arañas. Monitorear la presencia de araña, sobre todo en sectores con polvo. Aplicar al observar su presencia, comenzando en sectores con antecedentes a orillas de caminos con alta presión de polvo. Repetir cada 10-15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.
	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	15-20	Aplicar preventivamente con brotes desde 10 a 15 cms, repitiendo con intervalos de 7 a 10 días o cada nuevo crecimiento vegetativo. Utilizar las dosis mayores según desarrollo vegetativo y severidad de la infección. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
Viveros Forestales (<i>Pinus radiata</i>)	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	10-12	Aplicar según condiciones cada 10-15 días. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada

APLICACIÓN AEREA

Parronales - Vid	Prevención de la Erinosis de la vid (<i>Colomerus vitis</i>) Prevención de arañas (Araña roja de la uva de mesa (<i>Oligonychus vitis</i>), Falsa araña roja de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>))	15-20	Tiene efecto supresor colateral sobre arañas. Monitorear la presencia de araña, sobre todo en sectores con polvo. Aplicar al observar su presencia, comenzando en sectores con antecedentes a orillas de caminos con alta presión de polvo. Repetir cada 10-15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.
	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	15-20	aplicar preventivamente con brotes de 15 cm. Repitiendo con intervalos de 7-10 días o a cada nuevo crecimiento vegetativo. Utilizar las dosis mayores según desarrollo vegetativo y severidad de la infección. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada
Remolacha azucarera	Oidio (<i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>)	5-8	Aplicar en forma preventiva al observar los primeros síntomas. Repetir cada 10-15 días. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada
Paltos	Araña roja del paltó (<i>Oligonychus yothersi</i>)	20-40	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.

*Utilizar las dosis mayores según desarrollo vegetativo y severidad de la infección

Periodo de Reingreso: Las personas y animales no deben ingresar al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación.

Incompatibilidad: Incompatible con Dinitrofenoles, Fenvalerato, Clorpirifos, Dimetoato y Aceites minerales. No aplicar antes de transcurridas 2 semanas de una aplicación de aceite, excepto si los tratamientos se realizan en periodo de dormancia. Para cítricos no aplicar antes de 21 días de alguna aplicación de aceite. No aplicar sobre cucurbitáceas (melón, sandía, pepino y zapallo) cultivados bajo condiciones de invernaderos.

Fitotoxicidad: no es fitotóxica a las dosis y en las épocas señaladas. Evite su uso en condiciones de temperatura alta (30°C o más) y sobre follaje humedecido.

Periodo de carencia: no tiene restricciones de carencia en los cultivos recomendados.



CUIDADO

