

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

BINGO® 48 SL es un herbicida, cuyo ingrediente activo Glifosato-isopropilamonio pertenece al grupo químico de los organofosfonatos.

A pesar de ser un herbicida de baja toxicidad, en su preparación se debe usar: Delantal, guantes de gomas, botas y protector facial. En su aplicación usar: Traje impermeable, guantes y botas de goma, y protector facial para evitar el contacto del producto con la piel. No permitir el ingreso ni la manipulación de terceras personas en área que están siendo sometidas a tratamientos; no permitir el ingreso de animales domésticos. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina líquida del producto asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación, lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto, incluyendo ropa de trabajo. **ECOTOXICIDAD:** Nocivo para organismos acuáticos. Toxicidad reducida en Aves. No tóxico para Abejas.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: No se conocen síntomas por dichos efectos.

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto ha sido inhalado, sacar a la persona afectada al aire libre. En caso de problemas respiratorios, proporcionar respiración artificial, acudir a un médico. Si el producto ha estado en contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón; retire la ropa contaminada y limpiar los residuos del producto con abundante agua y jabón. Si el producto ha entrado en contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua manteniendo los párpados bien abierto por al menos 15 minutos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lave los ojos con abundante agua de la llave por 5 minutos y luego retirarlos y continuar el lavado hasta completar 15 o 20 minutos; acudir a un médico. Si el producto ha sido ingerido, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico con la etiqueta del producto. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: No existe un tratamiento específico; efectuar tratamiento sintomático y ofrecer primeros auxilios, y descontaminación del cuerpo. **ANTÍDOTOS:** No tiene antídoto específico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES; PARA ELLO ADICIONAR AGUA HASTA UN CUARTO DEL VOLUMEN DEL ENVASE, TAPAR Y AGITAR EN TODAS LAS DIRECCIONES PARA FINALMENTE DISPONER ESTE ENJUAGUE DENTRO DE LA BOMBRA DE FUMIGACIÓN O EN EL TANQUE DE MEZCLA DE LOS PRODUCTOS. ESTA ACCIÓN SE DEBEREPETIR TRES VECES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Teléfonos de Emergencia:

Centro Toxicológico CITUC (+56-2) 26353800; STOCKTON CHILE LTDA (Importador): (+562) 27599224.

Conservar este producto en sus envases originales, bien cerrados, etiquetados y guardado bajo llave en un lugar exclusivo para productos fitosanitarios, fresco y seco. Los envases vacíos perforarlos y eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar permitido o designado para este fin por la autoridad competente.

NOTA AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la óptima calidad y el porcentaje de Ingrediente Activo señalado en la etiqueta, hasta que el producto salga de nuestro control directo, ya que el manejo de éste es de responsabilidad absoluta del usuario el usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan a la responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento, uso y manejos de este producto cualquiera sea el método de aplicación que se emplee.

BINGO[®] 48 SL

HERBICIDA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

BINGO® 48 SL es un herbicida, simplástico, no selectivo para el control de malezas de post emergencia de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en cultivos de frutales, cítricos, berries, vides, kiwis, plantaciones forestales, barbechos en cero y mínima labranza, regeneración de praderas de acuerdo a lo indicados en el cuadro de instrucciones de usos de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Glifosato-isopropilamonio (*)..... 48 % p/v (480 g/L).

Coformulantes c.s.p.c..... 100 % p/v (1 L).

* Sal isopropilamónica de *N*-(fosfonometil)glicina (36,5% p/v (356 g/L) de equivalente ácido de glifosato.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 3560.

Fecha de Vencimiento:

Lote Nº:

Contenido Neto: 1 Lt.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Importado y Distribuido en Chile:

STOCKTON CHILE LTDA.

Badajoz 100, Of 1206, Las Condes

Santiago - CHILE.

Fabricado por:

JIANGYIN Nº2 Pesticides Co. Ltd.

Nº78 Yunting Songqiao, Jiangyin

Jiangsu - CHINA.

BINGO® 48 SL es una Marca Registrada de **STOCKTON LTD.**



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

BINGO® 48 SL es un herbicida sistémico, simplástico no selectivo que se absorbe por las hojas y tallos verdes, y luego es trasladado hacia los puntos de activo crecimiento, como brotes aéreos, raíces y propágulos en malezas perennes.

Cuadro Instrucciones de Uso

CULTIVOS	MALEZAS	DOSES (L/Há)	OBSERVACIONES
Manzano, Peral, Membrillero, Almendra, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Duraznero, Guindo, Nectarino, Clementina, Limonero, Mandarino, Naranja, Pomelo, Tangelo, Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora, Cranberries, Zarzaparrilla, Nogal, Kiwi, Chirimoyo, Granada, Avellano, Caqui, Papayo, Olivo, Palto, Pecano, Pistacho, Mango, Vides Viníferas, de Mesa y Pisqueras.	Malezas Anuales de hoja ancha: Alfilerillo, Bledo, Bolsita del Pastor, Cardos, Chamico, Manzanilla, Malva, Quingüilla, Quilloy-quilloy, Rábano, Sanguinaria, Verdolaga, Verónica, Yuyo.	2,0 – 3,0	Aplicar en forma dirigida a las malezas cuando estas tengan 5-15 cm de altura. Para situaciones con malezas difíciles de controlar y/o alta presión de malezas usar dosis máximas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
	Malezas Anuales de hoja angosta: Avenilla, Ballica, Pasto quila, Bromo, Hualcacho, Chépica, Pega-pega, Poa o Piojillo.	2,0 – 3,0	
	Malezas Perennes de hoja ancha: Correhuela, Falso té, Galega, Zorzamora.	4,0 – 5,0	Aplicar en forma dirigida a las malezas cuando estas tengan 5-15 cm de altura. Para control de Falso té y Maicillo aplicar 30-35 días después de la emergencia. Para control de Correhuela, aplicar al inicio de floración. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
	Malezas Perennes de hoja angosta: Chépica blanca, Pasto quila, Maicillo, Pasto Cebolla.	3,0 – 4,0	
Forestales (Pino y Eucalipto); Cero Labranza, Barbecho químico, Regeneración de praderas.	Pasto Bermuda	5,0 – 6,0	Para Pasto Bermuda aplicar con la maleza en activo crecimiento y con estolones de 25 cm. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
	Chufas	5,0 – 6,0	Para Chufas aplicar cuando la maleza tenga de 10 a 20 hojas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.

Nota 1: Las aplicaciones pueden realizarse con equipos de pulverizadores de mochila, terrestres o aéreos con las boquillas que correspondan de acuerdo a cada caso. El mojamiento terrestre debe ser idealmente con 80-120 lts de agua/há y no superior a 200 L/há. Los intervalos entre aplicaciones dependerán del crecimiento de las malezas, presión de las malezas y la época del año, pudiendo ser para la época de primavera/verano cada 30-50 días y otoño/invierno 50-60 días. Las aplicaciones aéreas sólo pueden realizarse en cultivos autorizados de Plantaciones Forestales. Barbecho químico y Regeneración de praderas con un mojamiento de 40 L/há en malezas herbáceas y 60 L/há en malezas arbustivas (zorzamora). "PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE".

Nota 2: La definición del uso de la dosis a emplear (dosis mayor o menor) está determinado por el grado de crecimiento de la maleza a eliminar, utilizando la dosis máxima en malezas de difícil control y/o con alta presión de malezas.

Nota 3: Las aplicaciones deben siempre realizarse en condiciones de seguridad y eficiencia favorables, considerando horario, temperatura, vientos y condiciones meteorológicas adecuadas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el estanque con agua hasta la mitad, agregar la cantidad requerida de **BINGO® 48 SL**, diluido previamente en un poco de agua y complete el volumen total con su agitación contantemente.

COMPATIBILIDAD: **BINGO® 48 SL** puede ser aplicado con otros herbicidas como Simazina, Atrazina, Oxifluorfen, Metsulfuron-metil, 2,4-D, MCPA, para aumentar el espectro de control.

INCOMPATIBILIDAD: **BINGO® 48 SL** es incompatible con productos de reacción alcalina, con arcillas y con productos que contengan metales bivalentes y trivalentes.

FITOTOXICIDAD: **BINGO® 48 SL** es fitotóxico sobre cualquier tejido vegetal no lignificado que tome contacto con el producto. En cultivos hortícolas de trasplante en general, bajo ciertas condiciones de suelos, fertilización de suelos, y/o sistema de riego tecnificado, en trasplante de almácigos, pueden ocurrir síntomas de fitotoxicidad.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se puede reingresar al área tratada 12 horas después de realizada la aplicación sin equipo de protección. El periodo de resguardo para el ingreso de persona y animales a los sectores tratados es de 12 horas.

PERIODOS DE CARENCIA: De acuerdo al tipo y forma de aplicación dirigida a las malezas o en situaciones sin presencia de cultivo (barbecho químico, cero labranza, pre-siembra o pre-emergencia de cultivos), no corresponde considerar carencias.

