

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El Ácido Giberélico, pertenece al grupo químico de las Giberelinas, el Ácido Indol-3-ilacético, pertenece al grupo químico de las Auxinas y la Zeatina pertenece al grupo químico de las Citoquininas. Se sugiere no aplicar en áreas ocupadas por seres humanos o animales y utilizar equipo de protección individual: delantal impermeable, botas de goma, guantes impermeables y protector facial durante la manipulación y aplicación. Al terminar la aplicación y antes de comer, beber o fumar, lavarse las manos y partes del cuerpo que hayan tenido contacto con la mezcla y lavar perfectamente la ropa que se usó durante la aplicación. No contaminar fuentes o cursos de agua. No tóxico a peces, aves ni abejas. Almacenar en lugares frescos con temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su envase original bien etiquetado, cerrado y separado de semillas y forrajes.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Inhalación: Ligera piloerección como reacción normal al aroma de extractos vegetales. Contacto con la piel: No irritante. Contacto con los ojos: Irritación y enrojecimiento moderado. Ingestión: Dependiendo de la cantidad ingerida, irritación ligera a moderada de mucosas del sistema digestivo, náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. **PRIMEROS AUXILIOS:** Inhalación: Traslade al paciente a un lugar ventilado y manténgalo en reposo. Contacte a un médico. **Contacto con la piel:** Lávese bien con abundante agua de la llave y jabón la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Retirar ropa y zapatos. Consulte a un médico. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Contactar a un especialista. **En caso de ingestión:** Inducir al vómito, sólo si la persona está consciente, introduciendo el dedo en la parte de atrás de la garganta o dando agua con sal. Buscar asistencia médica. **ANTIDOTO:** Los extractos de origen vegetal empleados para la elaboración de este producto no son tóxicos por lo que no se cuenta con antídoto específico. **TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** Dar tratamiento sintomático y de soporte. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTO, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.

Instrucciones para el Triple Lavado: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo. **En caso de INTOXICACIÓN llamar al tóno: 22635 38 00, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 horas, convenio CITUC/AFIPA, o a RITA-CHILE: 22777 19 94. El teléfono del importador es 22560 45 00, Santiago, Chile.**
© Biozyme TF y GBM son marcas registradas de Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.V.

BIOZYME® TF

**FITORREGULADOR
CONCENTRADO SOLUBLE
SL**

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 4.095

Biozyme® TF es un fitorregulador de tipo complejo, obtenido de extractos de origen vegetal. Se aplica foliarmente y permite incrementar rendimiento y calidad en el cultivo de Vid de mesa, Arándanos y Cerezos

Composición

Acido Giberélico*	0,0036% p/v (0,036 g/L)	% p/v
Acido Indol-3-ilacético	0,0036% p/v (0,036 g/L)	
Zeatina**	0,0094% p/v (0,094 g/L)	
Coformulantes, c.s.p.	100% (1 L)	

*Acido (3S,3aR,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-metil-6-metileno-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propeno[1,2-b]furan-4-carboxílico
**2-metil-4-(9H-purin-6-ilamino)but-2-en-1-ol

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Importa y Distribuye:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610,
Huechuraba, Santiago, Chile.
ET4095V-006 (va)
OS1

Fabricado y Formulado por:
Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V.
Blvd. Jesús Valdés Sánchez 2369
Saitillo, Coahuila, México 25290.
www.gbm.com

Contenido neto:
1L 12 x 1L
10L 2 x 10L
20L 200L

Lote N°:
Fecha Vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO

Biozyme®TF es un producto de origen vegetal que contiene las tres principales hormonas que, bajo condiciones normales, producen las plantas. El balance cuantitativo de estas hormonas permite promover una mayor eficiencia en los diferentes procesos metabólicos de la planta, dependiendo del momento de aplicación, con el consiguiente aumento en rendimiento y calidad de la producción.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
Vid cv. Thompson S.	1,5-2,0 L/ha	Bayas de 3-4 mm	2 aplicaciones por temporada a todo el follaje.
	1,5-2,0 L/ha	Bayas de 5-6 mm	
Vid cv. Thompson S.	350-500 cc/hL	Bayas de 4-6 mm	Una aplicación por temporada dirigida a los racimos.
Vid cv. Flame S.	1,5-2,0 L/ha	Bayas de 4-5 mm	2 aplicaciones por temporada a todo el follaje.
	1,5-2,0 L/ha	Bayas de 6-7 mm	
Vid cv. Flame S.	250-350 cc/hL	Bayas de 5-7 mm	Una aplicación por temporada dirigida a los racimos.
Vid cv. Superior	350-500 cc/hL	Bayas 8-12 mm	Una aplicación por temporada dirigida a los racimos.
Vid cv. Red Globe	1,5-2,0 L/ha	Bayas de 6-8 mm (*)	1a aplicación al follaje, 2a aplicación dirigida a los racimos o inmersión.
	350-750 cc/hL	Bayas de 12-16 mm	
Vid cv. Crimson	1,5-2,0 L/ha	Bayas de 4-5 mm (*)	1a aplicación al follaje, 2a aplicación dirigida a los racimos o inmersión.
	350-500 cc/hL	Bayas de 6 - 8 mm	
Arándanos	1 a 2 L/ha (**)	Para mejorar calibre y peso aplicar con fruto recién cuajado.	Realizar 2 a 3 aplicaciones para completar 3 a 4 L/ha/temporada, repetir cada 10 días. Usar dosis mayores en plantas en plena producción, utilizando mojamientos entre 500 a 1000 L de agua/ha.
Cerezos	1,5 a 2 L/ha (**)	Aplicar en plena flor y repetir con una frecuencia de 7 días. En variedades con exceso de cuaja, hacer la primera aplicación a caída de pétalos y repetir a los 7 días.	Realizar 2 aplicaciones por temporada. Usar la dosis mayor en huertos de mayor nivel productivo y la dosis menor en huertos jóvenes o de menor nivel productivo. Usar un mojamiento acorde al tamaño de los árboles (entre 1500 a 2000 L/ha) que asegure un buen cubrimiento.

En Vides aplicar la dosis mayor según las condiciones de la planta, la carga frutal y la variedad, utilizando mojamientos de 1.500 L de agua/ha. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

En Thompson S. y Flame S. elegir la recomendación según el tipo de aplicación usada normalmente (a todo el follaje o dirigida a racimos). En el caso de Thompson Seedless, Flame Seedless y Superior pueden ir mezcladas con Ac. Giberélico (Ac. GA₃). Para otras variedades, seguir la misma recomendación indicada para Flame S. en el cuadro de Instrucciones de Uso. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

(*) Para Red Globe y Crimson la 1ra. aplicación debe hacerse sola, la 2da. aplicación se puede mezclar con Ac. Giberélico (Ac. GA₃). **PREPARACIÓN:** Biozyme®TF debe ser mezclado en suficiente agua para obtener un buen cubrimiento del follaje o de los racimos, según el tipo de aplicación usada. Puede ser aplicado, con cualquier equipo de aspersión. Agite el producto muy bien antes de usarse y lávese los residuos con agua limpia, vertiéndose los mismos al tanque. **COMPATIBILIDADES:** (*) Biozyme®TF puede usarse en conjunto con un adyuvante. **INCOMPATIBILIDADES:** Biozyme®TF no presenta incompatibilidad con los agroquímicos de acción neutra, sin embargo, se recomienda hacer una pequeña prueba antes de proceder a su mezcla con otros productos. **FITOTOXICIDAD:** Biozyme®TF no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso. **TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Biozyme®TF no tiene restricción respecto al reingreso al área tratada, pero se recomienda reingresar, hasta que haya secado la aspersión, esto ocurre durante las 2 primeras horas dependiendo de la temperatura ambiental. Para ingreso de animales no corresponde establecer tiempo, debido al tipo de cultivo sobre el que se aplica el producto. **CARENCIAS:** No corresponde.



CUIDADO

