

Santiago, 15 de febrero de 2019

SEÑOR:
 RODRIGO ASTETE ROCHA
 JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRICOLA Y FORESTAL
 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
 AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
 SANTIAGO. -

OF. DE PARTES CENTRAL
 N°:
 19 FEB 2019
 A:
 CON ANT. SIN ANT.

At: Sr. Roberto Antonio Tapia, Jefe del Sub-departamento de Plaguicidas y Fertilizantes.

Ref.: Declaración de eficacia del plaguicida ABSOLUTO® 20% SL, cuyo ingrediente activo es IMIDACLOPRID, número de autorización SAG 1.764, para el control de *Bagrada hilaris* en los cultivos de frutilla, acelga, ajo, alcachofa, arvejas, brócoli, cebollas, coliflor, espinacas, habas, lechugas, albahaca, melón, papa, pepino, pimentón, poroto, raps, repollo, tomate, sandia, zapallo, limonero, naranjo, pomelo y mandarina en Chile.

ABSOLUTO® 20% SL para el control de *Bagrada hilaris* puede ser aplicado, 2 VECES durante la temporada, en plantas de frutilla, acelga, ajo, alcachofa, arvejas, brócoli, cebollas, coliflor, espinacas, habas, lechugas, melón, papa, pepino, pimentón, poroto, raps, repollo, tomate, sandia, zapallo, limonero, naranjo, pomelo y mandarina, entregando un período de protección no mayor a 7 días.

IMIDACLOPRID, ingrediente activo de ABSOLUTO® 20% SL, actúa por CONTACTO E INGESTIÓN, RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE UNA AMPLIA GAMA DE INSECTOS.

El producto ABSOLUTO® 20% SL debe ser aplicado de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro.

Cultivo	Dosis (cc/hL)	Período de Protección (días)	Aplicaciones por Temporada	Tiempo Reingreso (hrs)	Carencias (días)
Frutilla		7	2		6
Acelga, Ajo, Alcachofa, Arvejas, Brócoli, Cebollas, Coliflor, Espinacas, Habas, Lechugas, albahaca, Melón, Papa, Pepino, Pimentón, Poroto, Raps, Repollo, Tomate, Sandia, Zapallo	68	7	2	2	Tomate, brócoli, repollo, coliflor: 7; Acelga, espinacas: 30; Raps, ajo: 25; Melón, sandía, cebollas: 10; Alcachofa, pimentón, lechugas, albahaca, zapallo, pepino, papa, poroto, arvejas, habas: 3

Cultivo	Dosis (cc/hL)	Período de Protección (días)	Aplicaciones por Temporada	Tiempo Reingreso (hrs)	Carencias (días)
Limonero, Naranja, Pomelo, Mandarino	80	7	2	2	21

Momento de Aplicación:

El producto ABSOLUTO® 20% SL debe ser aplicado por vía foliar, tan pronto se detecte la presencia de la plaga. Se recomienda realizar la aplicación muy temprano en la mañana o al final del día.

Forma de Aplicación

El producto ABSOLUTO® 20% SL debe ser aplicado por vía foliar, tomando la precaución de mojar bien el follaje. En hortalizas, utilizar un mojamiento de 400 – 600 L de agua/ha., y en frutales cítricos, utilizar un mojamiento de 1.500 a 2.000 L de agua/ha., dependiendo del estado fenológico del cultivo. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Se recomienda no aplicar ABSOLUTO® 20% SL con viento, ni en horas de calor excesivo, ni con follaje humedecido. No aplicar ABSOLUTO® 20% SL en período de floración del cultivo, o bien remover las colmenas antes de su aplicación, ya que es tóxico para abejas.



Juan Ignacio Reyes
Departamento Técnico
Point Chile S.A.

Bibliografía Adjunta:

- Vitta N., J. Lagos, P. Estay. 2017. Evaluación de la eficacia y período de protección de insecticidas autorizados para su uso sobre *Bagrada hilaris* en ensayos de laboratorio y de campo sobre especies de la familia Brassicaceae. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).