

Santiago, 15 de febrero de 2019

SEÑOR:
 RODRIGO ASTETE ROCHA
 JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRICOLA Y FORESTAL
 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
 AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
 SANTIAGO. -



At: Sr. Roberto Antonio Tapia, Jefe del Sub-departamento de Plaguicidas y Fertilizantes.

Ref.: Declaración de eficacia del plaguicida ABSOLUTO® 70% WP, cuyo ingrediente activo es IMIDACLOPRID, número de autorización SAG 1.760, para el control de *Bagrada hilaris* en los cultivos de frutilla, tomate, ají, alcachofa, haba, acelga, pimiento, pepino, melón, zapallo italiano, repollo, coliflor, kale, lechuga, rúcula, albahaca, cilantro, limonero, naranjo, pomelo y mandarina en Chile.

ABSOLUTO® 70% WP para el control de *Bagrada hilaris* puede ser aplicado, 2 VECES durante la temporada, en plantas de frutilla, tomate, ají, alcachofa, haba, acelga, pimiento, pepino, melón, zapallo italiano, repollo, coliflor, kale, lechuga, rúcula, albahaca, cilantro, limonero, naranjo, pomelo y mandarina, entregando un período de protección no mayor a 7 días.

IMIDACLOPRID, ingrediente activo de ABSOLUTO® 70% WP, actúa por CONTACTO E INGESTIÓN, RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE UNA AMPLIA GAMA DE INSECTOS.

El producto ABSOLUTO® 70% WP debe ser aplicado de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro.

Cultivo	Dosis (g/hL)	Período de Protección (días)	Aplicaciones por Temporada	Tiempo Reingreso (hrs)	Carencias (días)
Frutilla	30	10	2	12	6
Tomate	30	10	2		3
Ají, Alcachofa, Haba, Acelga, Pimiento, Pepino, Melón, Zapallo italiano, Repollo, Coliflor, Kale, Lechuga, Rúcula, Albahaca, Cilantro	15	10	2		Melón, kale: 10; Pimiento, repollo: 7; Ají, alcachofa, lechuga, rúcula, albahaca, cilantro, pepino, zapallo italiano; coliflor, haba: 3
Raps.		20	2		25
Cebada, Maíz	20	20	2		30

Cultivo	Dosis (g/hL)	Período de Protección (días)	Aplicaciones por Temporada	Tiempo Reingreso (hrs)	Carencias (días)
Limonero, Naranja, Pomelo, Mandarino	30	10	2	12	21

Momento de Aplicación:

El producto ABSOLUTO® 70% WP debe ser aplicado por vía foliar, tan pronto se detecte la presencia de la plaga. Se recomienda realizar la aplicación muy temprano en la mañana o al final del día.

Forma de Aplicación

El producto ABSOLUTO® 70% WP debe ser aplicado por vía foliar, tomando la precaución de mojar bien el follaje. En hortalizas, utilizar un mojamiento de 300 – 600 L de agua/ha., en cereales utilizar un mojamiento de 200 L de agua/ha., y en frutales cítricos, utilizar un mojamiento de 1.500 a 2.000 L de agua/ha., dependiendo del estado fenológico del cultivo. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Se recomienda no aplicar ABSOLUTO® 70% WP con viento, ni en horas de calor excesivo, ni con follaje humedecido. No aplicar ABSOLUTO® 70% WP en período de floración del cultivo, o bien remover las colmenas antes de su aplicación, ya que es tóxico para abejas.



Juan Ignacio Reyes
Departamento Técnico
Point Chile S.A.

Bibliografía Adjunta:

- Vitta N., J. Lagos, P. Estay. 2017. Evaluación de la eficacia y período de protección de insecticidas autorizados para su uso sobre *Bagrada hilaris* en ensayos de laboratorio y de campo sobre especies de la familia Brassicaceae. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).