

Bayer



Bayer S.A.
Bayer CropScience
Av. Andrés Bello 2457. Piso
21.
Providencia
Santiago – Chile

Fono: (56-2) 2520 8200
www.bayercropscience.cl

OF. DE PARTES CENTRAL
Nº :
27 MAR 2019
A: /
<input checked="" type="checkbox"/> CON ANT. <input type="checkbox"/> SIN ANT.

Señor
Rodrigo Astete Rocha
Jefe División Protección Agrícola y Forestal
Servicio Agrícola y Ganadero
Av. Presidente Bulnes N° 140
Santiago

Santiago, 13 de marzo de 2019

Cc. Roberto Tapia Soto, Jefe Subdepartamento Departamento Plaguicidas y Fertilizantes
Departamento Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas.

Ref. Presentación documentación y solicitud de autorización de uso de **Bulldock 125 SC** bajo el marco del control obligatorio de *Bagrada hilaris*.

De nuestra consideración:

Por la presente, solicito a Ud. autorización para uso de **Bulldock 125 SC** en el control de *Bagrada hilaris*, insecticida con las siguientes características:

Nombre comercial:	Bulldock 125 SC
No de autorización:	1.466
Ingrediente(s) activo(s):	Beta-Cyfluthrin
Composición:	12,5% p/v (125 g/l)
Tipo de formulación:	Suspensión Concentrada (SC)
Aptitud de uso:	Insecticida
Cultivos	Brócoli, coliflor, repollo, mizuna, kale, rúcula, repollito de Bruselas, col forrajera, nabo, colinabo, rabanito, bimi, y pak choi, mostaza, raps, col chino (pe-tsai o repollo chino) , alyssum, alhelí, lechuga, acelga, espinaca, achicoria, betarraga, apio, cilantro, albahaca, zanahoria, alcachofa, espárrago, papa, zapallo italiano, melón, zapallo, sandia, tomate, pimiento, ají, , pepino dulce, pepino, cebada, maravilla, maíz, alfalfa, soya, garbanzo, haba, lenteja, poroto, arveja, frutilla, cítricos, cebolla, ajo
Dosis (mL/ha):	100
Concentración (mL/100 L):	35
Vol agua (L/ha)	400
Forma de aplicación:	Foliar
Época de aplicación:	Al aparecer los primeros individuos hasta pre-cosecha.
No de aplicaciones:	1
Período de protección (días):	7

Carencia (días):	Brócoli, coliflor, repollo, mizuna, kale, rúcula, repollito de Bruselas, col forrajera, nabo, colinabo, rabanito, bimi, y pak choi: 7 días mostaza, raps, col chino (pe-tsai o repollo chino) , alyssum, alhelí: 41 días Lechuga, acelga,: 7 días Espinaca, achicoria, betarraga: 12 días Apio, cilantro, albahaca, zanahoria, alcachofa, espárrago: 7 días Papa: 15 días zapallo italiano, melón, zapallo, sandia: 7 días tomate, pimiento, ají, , pepino dulce, pepino: 7 días cebada, maravilla, maíz, alfalfa, : 30 días soya, garbanzo, haba, lenteja, poroto, arveja: 12 días frutilla: 14 días cítricos: 1 día cebolla, ajo: 17 días
Tiempo de reingreso (horas):	2

Para tal efecto se adjunta se adjunta información bibliográfica que demuestra la eficacia de **Bulldock 125 SC** en el control de *Bagrada hilaris*.

Saluda atentamente a Ud.,



Roberto Marti B.
Desarrollo Agronómico



Michelle Pomareda S.
Asuntos Regulatorios