

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE EFICACIA

De acuerdo a la información presentada, solicitamos incluir, nuestro producto Imaxi 350 SC (Imidacloprid 350 SC), N° SAG 1692, para el control de *Bragada Hilaris* en los cultivos de **BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO, RABANITO, PAK CHOI**

Cultivo	Dosis	Mojamiento	Período de protección	Carencia	Tiempo Reingreso	Momento de aplicación
Brócoli	30 cc/hl	300 - 600 L/ha	10 días	7	24 horas	Inmediatamente posterior a la siembra o trasplante, de acuerdo a monitoreo de la plaga. Aplicar muy temprano en la mañana o muy tarde, evitando las horas de calor.
Coliflor						
Repollo						
Rabanito						
Pak Choi						

5. RESPALDOS BIBLIOGRÁFICOS

- *Bragada hilaris* Burmeister Chinche *Bragada* Ficha Técnica No. 42. SAGARPA. 2014.
- <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bagrada-hilaris-o-chinche-pintada/3022/registros>
- <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bagrada-hilaris-o-chinche-pintada>