

Santiago, 18 de febrero de 2019

SEÑOR:  
 RODRIGO ASTETE ROCHA  
 JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL  
 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO  
 AV. PRESIDENTE BULNES N° 140  
 SANTIAGO. -

OF. DE PARTES CENTRAL	
N°: .....	
19 FEB 2019	
A: .....	
<input type="checkbox"/> CON ANT.	<input type="checkbox"/> SIN ANT.

At: Sr. Roberto Antonio Tapia, Jefe del Sub-departamento de Plaguicidas y Fertilizantes.

**Ref.:** Declaración de eficacia del plaguicida PERMETRINA 50 CE, cuyo ingrediente activo es PERMETRINA, número de autorización SAG 1.388, para el control de *Bagrada hiliaris* en el cultivo indicados en tabla más abajo, en Chile.

PERMETRINA 50 CE para el control de *Bagrada hiliaris* puede ser aplicado, 2 VECES durante la temporada, en los cultivos detalladas más abajo, entregando un período de protección no mayor a 5 días.

La dosis recomendada de PERMETRINA 50 CE para el control de *Bagrada hiliaris* es de 50 cc / 100 L de agua.

PERMETRINA, ingrediente activo de PERMETRINA 50 CE, actúa por CONTACTO E INGESTIÓN, RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE UNA AMPLIA GAMA DE INSECTOS.

El producto PERMETRINA 50 CE debe ser aplicado de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro.

Cultivo	Dosis (cc/ha)	Período de Protección (días)	Aplicaciones por Temporada	Tiempo Reingreso (hrs)	Carencias (días)
Maíz	250	5	2	4	7
Lechuga, Albahaca, Rúcula, Cilantro	460	5	2		7
Tomates, Repollo, Repollo chino, Pak choi, Kale, Pimiento, Ají, Coliflor, Brócoli, Melón, Zapallo, Sandía, Pepino, Radiccio, Achicoria, Rabanito, Alcachofa		5	2		3
Ajo, Cebolla, Chalota		5	2		15

Cultivo	Dosis (cc/ha)	Período de Protección (días)	Aplicaciones por Temporada	Tiempo Reingreso (hrs)	Carencias (días)
Frutilla	460	5	2	4	11
Espárrago		5	2		3
Empastadas, Alfalfa,		5	2		15
Poroto, Papa, Raps, Maravilla, Cebada		5	2		Maravilla, raps: 15 Papa: 8 Poroto: 7 Cebada: 30

El producto PERMETRINA 50 CE debe ser aplicado por vía foliar, tan pronto se detecte la presencia de la plaga. Se recomienda realizar la aplicación muy temprano en la mañana o al final del día.

Se recomienda no aplicar PERMETRINA 50 CE con viento, ni en horas de calor excesivo, ni con follaje humedecido. No aplicar PERMETRINA 50 CE en período de floración del cultivo, o bien remover las colmenas antes de su aplicación, ya que es tóxico para abejas.



**Juan Ignacio Reyes**  
Departamento Técnico  
Point Chile S.A.

**Bibliografía Adjunta:**

Palumbo, J.C. 2015. Knockdown and Residual Control of Bagrada Bug With Foliar Insecticides in Broccoli: *2013 Efficacy Report*. Yuma Agricultural Center.