

Santiago, 18 de febrero de 2019

SEÑOR:
 RODRIGO ASTETE ROCHA
 JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
 AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
 SANTIAGO. -



At: Sr. Roberto Antonio Tapia, Jefe del Sub-departamento de Plaguicidas y Fertilizantes.

Ref.: Declaración de eficacia del plaguicida QUILATE® 700 WP, cuyo ingrediente activo es ACETAMIPRID, número de autorización SAG 1.852, para el control de *Bagrada hilaris* en los cultivos de tomate, pimiento, raps, clementino, limonero, naranjo, pomelo, tangerina y tangelo en Chile.

QUILATE® 700 WP para el control de *Bagrada hilaris* puede ser aplicado, 2 VECES durante la temporada, en plantas de tomate, pimiento, raps, clementino, limonero, naranjo, pomelo, tangerina y tangelo, entregando un período de protección no mayor a 10 días.

ACETAMIPRID, ingrediente activo de QUILATE® 700 WP, actúa por CONTACTO E INGESTIÓN, RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE UNA AMPLIA GAMA DE INSECTOS.

El producto QUILATE® 700 WP debe ser aplicado de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro.

Cultivo	Dosis (g/hL)	Período de Protección (días)	Aplicaciones por Temporada	Tiempo Reingreso (hrs)	Carencias (días)
Tomate, Pimentón	30	10	2	12	7
Clementino, Limonero, Naranjo, Pomelo, Tangerina, Tangelo	30	10	2	12	10
Raps	30	10	2	12	28

Momento de Aplicación:

El producto QUILATE® 700 WP debe ser aplicado por vía foliar, desde almácigo en adelante. Se recomienda realizar la aplicación muy temprano en la mañana o al final del día.



Forma de Aplicación

El producto QUILATE® 700 WP debe ser aplicado por vía foliar, tomando la precaución de mojar bien el follaje. En hortalizas, utilizar un mojamiento de 300 – 800 L de agua/ha., en raps utilizar un mojamiento de 200 L de agua/ha., y en frutales cítricos, utilizar un mojamiento máximo de 2.000 L de agua/ha., dependiendo del estado fenológico del cultivo. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Se recomienda no aplicar QUILATE® 700 WP con viento, ni en horas de calor excesivo, ni con follaje humedecido. No aplicar QUILATE® 700 WP en período de floración del cultivo, o bien remover las colmenas antes de su aplicación, ya que es tóxico para abejas.



Juan Ignacio Reyes
Departamento Técnico
Point Chile S.A.

Bibliografía Adjunta:

- Vitta N., J. Lagos, P. Estay. 2017. Evaluación de la eficacia y período de protección de insecticidas autorizados para su uso sobre *Bagrada hilaris* en ensayos de laboratorio y de campo sobre especies de la familia Brassicaceae. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).