

## 4. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE EFICACIA

- De acuerdo a la información presentada, solicitamos incluir, nuestro producto Imaxi 350 SC (Imidacloprid 350 SC), N° SAG 1692, para el control de *Drosophila Suzukii* en los cultivos de DURAZNOS, NECTARINO, DAMASCO, CEREZO, CIRUELO, MANZANO, PERA, MEMBRILLO, UVA.

Cultivo	Dosis	Mojamiento	Período de protección	Carencia	Tiempo Reingreso	Momento de aplicación
Durazno	15 cc/hl	1500 L/ha	7 días	25	24 horas	Aplicar desde la aparición de los primeros ejemplares hasta pre-cosecha, con un máximo de aplicaciones de acuerdo con lo registrado en el monitoreo de la plaga.
Nectarino				18		
Damasco				18		
Cerezo				21		
Ciruelo				25		
Manzano				21		
Pera				15		
Membrillo				15		
Uva				25		

## 5. RESPALDOS BIBLIOGRÁFICOS

- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), julio 2013.
- <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/drosophila-suzukii>
- FICHA TÉCNICA N° 7 HOSPEDANTES Y DAÑOS DE *Drosophila suzukii*, SAG.
- Spotted Wing *Drosophila*: A Potential Pest of Arkansas Fruit and Vegetables, University of Arkansas).
- 2015 Insecticides for Blueberries, Strawberries, Caneberries and Grapes for Spotted Wing *Drosophila*, Updated 06/1/2015- Mary Concklin, University of Connecticut)
- <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/drosophila-suzukii/2971/registros>