

INSECTICIDA

# DONAU 25 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1697

**DONAU 25 SC**, es un insecticida con acción de contacto e ingestión, que actúa sobre los insectos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

## COMPOSICIÓN:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Fipronilo (*)  | 25% p/v (250 g/l) |
| Cofomulantes c.s.p   | 100% p/v (1 l)    |
| (*) (RS)-5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha$ -trifluoro- <i>p</i> -tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo |                   |

## << LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia  
SANTIAGO - CHILE

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

**ANASAC CHILE S.A**

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA - CHILE

**Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou County,

Zhejiang, China. ZIP: 324400

## NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

**DONAU 25 SC**, insecticida cuyo ingrediente activo Fipronilo pertenece al grupo químico de los Fenilpirazoles. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**DONAU 25 SC**, es muy tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves y altamente tóxico para abejas.

### << MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DE PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

**Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático. **Primeros auxilios:** **En caso de contacto cutáneo:** retire ropa y zapatos contaminados. Limpie bien los restos del producto y lave con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto ocular:** lavar bien los ojos con agua limpia, por al menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** retirar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo a un lugar fresco, pero manteniéndolo abrigado. Si es necesario practicar respiración artificial. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

**Síntomas de intoxicación:** irritación de ojos y de las vías respiratorias, vómitos, dolor faríngeo, hiperactividad y temblor corporal.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

**Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24869000 (ANASAC)**

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO>>

**Instrucciones para el Triple Lavado:** Se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara. Al finalizar el triple lavado, inutilizar el envase y eliminarlo de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.

Conserve **DONAU 25 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



# NOCIVO



## INSTRUCCIONES DE USO

**DONAU 25 SC**, es un insecticida de contacto e ingestión utilizado para el tratamiento de semillas en el control de los insectos del suelo que atacan las semillas o a las plantas en sus primeros estados de desarrollo mencionados en el siguiente cuadro.

### Cuadro de Instrucciones de Uso:

| CULTIVO              | PLAGA                               | DOSIS                                | OBSERVACIONES   | CARENCIAS (días) |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| TRIGO                | Gusanos blancos<br>Gusanos alambres | 200 cc/100 kg de semilla             | Para un buen cubrimiento de la semilla, agregar 0,5-1,0 L de agua/100 kg de semilla.<br>Controla gorgojo argentino en estado larvario.        | N.C              |
|                      | Mosca tana<br>Gorgojo argentino     | 400 cc/100 kg de semilla             |   |                  |
| BALLICA<br>REMOLACHA | Gusano blanco<br>Gusano alambre     | 200 cc/ 25 kg de semilla             | Aplicar en máquina para tratamiento de semillas, agregando 0.25 L de agua/25 Kg de semilla.<br>Controla gorgojo argentino en estado larvario. | N.C              |
|                      | Gorgojo argentino<br>Mosca tana     | 400 cc/ 25 kg de semilla             |   |                  |
| MAIZ                 | Mosca Tana<br>Gusanos Alambres      | 125 cc/ bolsa de 25-30 kg de semilla | Para un buen cubrimiento de la semilla agregar 0,35 L de agua/100 Kg de semilla.  | N.C.             |
|                      | Gorgojo argentino                   | 500 a 600 cc/100 kg de semilla       |   |                  |
| LUPINO               | Mosca de la semilla                 | 100 cc/100 kg de semilla             | Para un buen cubrimiento agregar 0,5-1 L de agua/100 kg de semilla.   | N.C.             |

N.C No corresponde por época de aplicación

### Instrucciones de Uso:

- Para un control eficiente, se recomienda que la aplicación de **DONAU 25 SC** se realice con semillas mezcladas en forma homogénea con el producto, de modo de asegurar una buena cobertura. Con este fin se recomienda combinar **DONAU 25 SC** con 0.25 a 1 litro de agua cada 100 kg de semilla, según tipo de semilla.
- Para la aplicación de **DONAU 25 SC** se recomienda utilizar un tambor mezclador o máquinas especiales para tratamiento de semillas.
- Toda semilla tratada con **DONAU 25 SC**, no debe emplearse para el consumo animal o humano. Tampoco deben ser utilizadas para fines industriales.
- Las semillas tratadas pueden ser almacenadas hasta 12 meses post-tratamiento, en un lugar fresco, seco y asilado de personas o animales.
- En maíz aplicar dosis mayor en zonas de alta presión de la plaga y dosis menor en zonas con presiones medias a bajas.
- Aplicar una vez por temporada.
- Realizar la desinfección de las semillas en un lugar bien ventilado e iluminado.

### Preparación de la mezcla:

Para obtener un buen cubrimiento, mezclar la dosis recomendada de **DONAU 25 SC** con la semilla en máquinas para tratamiento de semillas o en tambor giratorio, agitando hasta obtener una distribución homogénea. Agregar entre 0.25 y 1 litro de agua cada 100 kilos de semilla, según se indica en el cuadro de instrucciones de uso, para lograr mejor adherencia

### Incompatibilidad:

Es incompatible con productos de reacción alcalina. En caso de utilizarlo en mezcla se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad.

**Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se puede mezclar con fungicidas como INDAR FLO 30 FS o ANAGRAN PLUS.

### Fitotoxicidad:

**DONAU 25 SC** no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**Tiempo de reingreso:** El ingreso al área de tratamiento de semillas debe ser con equipo completo de protección, o bien esperar 24 horas para ingresar al sector tratado para personas o animales.



# NOCIVO

