

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Iprodiona pertenece al grupo químico de las dicarboximidias.

No comer, beber o fumar durante su aplicación y preparación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal durante la preparación del producto: antiparras, máscara con filtro, overol impermeable, botas de goma y guantes impermeables.

Equipo de protección personal durante la aplicación del producto: antiparras, máscara con filtro, overol impermeable, botas de goma y guantes impermeables.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos.

Conservar el producto en una bodega, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

Síntomas de Intoxicación: tos, irritación nasal, vómitos, diarrea, irritación dérmica y enrojecimiento, lagrimeo e irritación de ojos.

Antídoto: no existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Iprodust Wine no es dañino al medio ambiente, es ligeramente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: no inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

En caso de contacto ocular: lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de ser necesario acudir a un médico especialista.

En caso de contacto cutáneo: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Buscar ayuda médica.

En caso de inhalación: llevar a la persona afectada a un lugar fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar atención médica.

Tratamiento médico de emergencia: si se ha ingerido una gran cantidad de fungicida durante las últimas horas, y no ha ocurrido vómito copioso, sería razonable considerar el método de descontaminación gastrointestinal. Puede usarse carbón activado añadiéndole el catártico sorbitol a la suspensión de carbón. Si se suministra sorbitol separadamente, este debe diluirse con una cantidad equitativa de volumen de agua antes de ser administrado.

No se recomienda más de una dosis del catártico sorbitol y debe usarse con cautela en los niños y ancianos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

En caso de intoxicación llamar :

Centro de Información Toxicológica UC (CITUC): 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 2 2836 8000

v207052019

I PRODUST WINE

Fungicida

Polvo Seco (DP)

Iprodust Wine, es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de moho gris (*Botrytis cinerea*) en vides.

COMPOSICIÓN:

Ingredientes Activos:	% p/p
Iprodiona*	5,5% (55 g/kg)
Coformulantes c.s.p.	100,0% (1 kg)

* 3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioximidazolidina-1-carboximida

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2732

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: kg.

Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por

Agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: Iprodust Wine, es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de moho gris en vides.

Equipo de aplicación: Espolvoreo terrestre.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Vides	Botritis, Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	18 - 20 kg/ha	Aplicar entre pinta y precosecha, fijándose en las carencias y tolerancias. No deben transcurrir más de 7 a 10 días entre aplicaciones, realizando un máximo de 2 aplicaciones en la temporada y siendo la última aplicación de precosecha la dosis más alta.

Preparación de la mezcla:

Para cada una de las aplicaciones, agregar **Iprodust Wine** al estanque del espolvoreador y aplicar.

Carencia (días):

7 días.

Precauciones:

Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 Km/h), y no aplicar con temperaturas altas (mayor a 28°C).

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y condiciones estipuladas en las recomendaciones propuestas.

Incompatibilidad:

Compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común.

Tiempo de reingreso:

Para personas, 24 horas después de la aplicación. Para animales no corresponde, por ser un cultivo no destinado a la alimentación animal.

Nota del fabricante:

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

