



We create chemistry

# Cycocel<sup>®</sup> - Extra

## Fitorregulador Concentrado soluble (SL)

Inhibidor y regulador del crecimiento de plantas en determinados estados de desarrollo, produciendo en trigo tallos más cortos y gruesos con lo que se reduce la tendencia a la tendadura del cultivo.

### Composición:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Cloruro de clomequat* | 46% p/v (460 g/L) |
| Cloruro de colina**   | 32% p/v (320 g/L) |
| Coformulantes, c.s.p. | 100% p/v (1 L)    |

\*Cloruro de 2-cloroetiltrimetilamonio

\*\*Cloruro de (2-hidroxietil)trimetilamonio

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 4025

**CORROSIVO METALES - NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE**

Lote:

Vencimiento:

**Contenido neto: 10 Litros**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:

**BASF S E**

67056 Ludwigshafen

Alemania

Importado y Distribuido por

**BASF Chile S.A.**

Carrascal 3851 - Casilla 3238

Fono: (2) 26407000

Santiago - Chile

Representante en Chile de BASF S E

© Marca Registrada de BASF



## CUIDADO



# Cycocel® - Extra

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Cloruro de Cloromequat y Cloruro de Colina pertenecen al grupo químico de los amonio cuaternarios.
- No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua después del uso del producto.

**Síntomas de intoxicación:** No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

## Primeros auxilios

Para todos los siguientes casos, trasladar al afectado **inmediatamente** a un centro asistencial y/o conseguir ayuda médica. Llevar la etiqueta o el envase.

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** Lavar la zona afectada con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Acudir al médico si persiste irritación.
- **Inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, proporcionar respiración artificial.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua sólo si la persona está consciente. Consiga ayuda médica.

**Tratamiento médico de emergencia:** Realizar terapia sintomática y de sostén.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

**Riesgos ambientales:** Cycocel® - Extra en condiciones normales de uso es no peligroso a abejas y aves de baja toxicidad a peces, sin embargo no contamine cursos de agua.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”, “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.**

## Procedimiento para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

## Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (2) 2640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (2) 2635 3800 (**Atención las 24 horas**).

CITUC Químico (Emergencia química): (2) 2247 3600

**Nota al Comprador:** Mediante ensayos cuidadosos, se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

ABRA AQUÍ - Instrucciones de Uso al Reverso



## CUIDADO



# Cycocel® - Extra

## INSTRUCCIONES DE USO

### GENERALIDADES

**Cycocel® - Extra** es utilizado principalmente para reducir la altura de la planta adulta del trigo y disminuir con ello la susceptibilidad a la tendadura, esto permite un aumento de la fertilización nitrogenada.

**Cycocel® - Extra** está especialmente recomendado por ejemplo para cultivares sensibles a tendadura, para siembras en zonas de mucho viento, y para cultivos de trigo que tendrán alta fertilización nitrogenada.

### CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

| Cultivo            | Objetivos   | Dosis          | Observaciones   |
|--------------------|---|----------------|---|
| Trigo de primavera | Disminución altura plantas y disminuir con ello la susceptibilidad a la tendadura | 2,0 a 2,5 L/ha | Aplicar <b>Cycocel® - Extra</b> en pulverización normal en plena macolla hasta que se vea el primer nudo (escala de Feekes 4 a 6 o de Zadokk 25 a 31). Aplicar las dosis recomendadas en 150 a 300 L agua/ha.<br>Realizar una aplicación por temporada. |
| Trigo intermedio   |   | 2,5 L/ha       |   |
| Trigo de invierno  |   | 2,5 a 3,0 L/ha |   |

**Aplicación:** Realizar la aplicación de acuerdo a lo indicado en el cuadro de Instrucciones de Uso. Evitar deriva, para lo cual se recomienda aplicar en horas de poco viento. No aplicar en condiciones de estrés del cultivo, tales como sequía, heladas, alzas bruscas de T° u otros. En caso de dudas, consulte a nuestro Departamento Técnico.

**Preparación de la mezcla:** El producto puro es corrosivo para los metales. Por ello para preparar la solución, adicionar primero una pequeña cantidad de agua al estanque y, a continuación el **Cycocel® - Extra** y agitar durante unos minutos para conseguir una mejor distribución. Después se añade el resto del agua.

**Incompatibilidad:** No se debe mezclar con productos hormonales, una vez que las plantas de trigo tengan ya de 6 a 7 hojas y se vea directamente el primer nudo. Las mezclas deben usarse inmediatamente después de preparadas.

**Compatibilidad:** **Cycocel® - Extra** es compatible con la mayor parte de los herbicidas, fungicidas, insecticidas y abonos foliares.

**Fitotoxicidad:** **Cycocel® - Extra** no presenta fitotoxicidad en trigo cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

**Periodo de Carencia:** No corresponde por el momento de aplicación. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

**Tiempo de Reingreso:** No hay restricciones una vez secado el depósito aplicado. Normalmente 4 horas de espera es suficiente. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

### Nota:

No aplicar **Cycocel® - Extra** en caso de un prolongado tiempo húmedo, dado que en este momento puede producirse un ataque más fuerte de enfermedades fungosas en las espigas. Heladas poco antes o después no tienen influencia negativa si se aplica **Cycocel® - Extra** sin adición de herbicidas hormonales. Después de la aplicación no debe llover durante una hora como mínimo.



## CUIDADO

