

FUNGICIDA
GOLDICLAN SC
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2876

GOLDICLAN SC, es un fungicida recomendado para el control de los hongos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

*Tebuconazol	36 % p/v (360 g/l)
**Kresoxim-metilo	8 % p/v (80 g/l)
Coformulantes c.s.p.	100 % p/v (1 l)
* (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol	
** (E)-metoxiimino[2-(o-toliloximetil)fenil]acetato de metilo	

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:


ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300
Providencia
SANTIAGO - CHILE

Lote N°:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA - CHILE

GLEBA S.A.

Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903)

Melchor Romero, La Plata, Provincia de Buenos Aires - Argentina

HUALONG CHEMICAL INDUSTRY Co. Ltd.

Oficina: 17ª Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road, Hangzhou 310004, China.

Fábrica: Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co. Ltd.

Town South Donghua District, Longyou County,

ZHEJIANG, CHINA, ZIP: 324400

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

GOLDICLAN SC, fungicida, compuesto por Tebuconazol perteneciente al grupo químico de los triazoles y Kresoxim-metilo perteneciente al grupo químico de los oximinocetatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación de la suspensión concentrada usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

GOLDICLAN SC, es muy tóxico para algas y microcrustáceos acuáticos, moderadamente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. PARA EL TRIPLE LAVADO SE RECOMIENDA LLENAR EL ENVASE HASTA ¼ DE SU VOLUMEN CON AGUA, CERRAR Y AGITAR DURANTE 30 SEGUNDOS. ABRIR EL ENVASE Y VERTER ESTE RESIDUO AL TANQUE DEL EQUIPO PULVERIZADOR. REPETIR AL MENOS DOS VECES MÁS HASTA QUE EL AGUA DE DESECHO SEA CLARA. INUTILIZAR LOS ENVASES. >>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo: retire la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua de la llave. En caso de contacto ocular: lave inmediatamente los ojos con agua limpia, durante 15 minutos. Y cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Si se presentan dificultades respiratorias, busque o solicite inmediata atención médica. En caso de ingestión: si la persona está consciente, administre mediana cantidad de agua, pero NO PROVOQUE vómitos. En todos los casos mantenga al paciente en reposo mientras se le envía al hospital más cercano.

Síntomas irritación gastrointestinal con diarrea

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conservar **GOLDICLAN SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO:

GOLDICLAN SC, es un fungicida sistémico y de contacto recomendado para el control de botrytis y oidio en vides.

Cuadro de instrucciones de uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
VIDES	Botrytis Oidio	65-90 cc/hl Mínimo 1 L/ha	Aplicar en floración (entre inicio de flor y plena flor), para control simultaneo de Botrytis y Oidio. Se puede repetir la aplicación en caso de ser necesario, con un intervalo de 14 días entre una aplicación y otra. Aplicar entre Pinta y Cosecha para control de Botrytis. Se recomienda lograr un buen cubrimiento en la aplicación. En caso de aplicaciones de bajo volumen aplicar un mínimo de 1 Lt/ha. Volumen de agua sugerido: 1.100 a 1.500 L/ha	12

Instrucciones de uso:

Realizar no más de 3 aplicaciones por temporada, dentro de un programa de control de enfermedades, en los momentos señalados. En el caso de realizar aplicaciones seguidas utilizar un intervalo mínimo de aproximadamente 14 días.

Precaución para ABEJAS:

GOLDICLAN SC está clasificado como virtualmente no tóxico para abejas, sin embargo se recomienda que las aplicaciones a cultivos que estén en período de floración se realicen al atardecer, en la noche o temprano en la mañana, cuando no haya actividad de las abejas.

En la floración de las vides no hay participación de abejas ni de otros insectos polinizadores.

Preparación de la mezcla:

Medir la dosis requerida de **GOLDICLAN SC** y luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento, para mantener una emulsión homogénea.

Incompatibilidad:

Evitar mezclas con insecticidas piretroides en formulación Concentrado Emulsionable.

En caso de duda respecto de la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

Fitotoxicidad:

No causa fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Reingreso al área tratada:

Para personas esperar 12 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

No corresponde un tiempo de reingreso para animales ya que el cultivo no tiene como objetivo la alimentación animal.



CUIDADO

