

200 mm

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

**Grupo Químico:** Mancolaxyl es un producto en base a Metalaxilo, el cual pertenece al grupo químico de las Acilalaninas y Mancozeb, el cual pertenece al grupo químico de los alquilenbis (ditiocarbamatos). No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Use equipo de protección personal (EPP) y evite el contacto del producto con su ropa y cuerpo.

**Para su seguridad durante la mezcla:** Use protector facial, mascarilla para polvos, delantal impermeable, guantes impermeables y botas de goma. **Para su seguridad durante la aplicación:** Use traje impermeable, protector facial, guantes y botas de goma. No aplique con viento. Aleje los animales domésticos y personas extrañas.

**Para su seguridad después de la aplicación:** Lávese con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, y después de trabajar. Cámbiese y lave la ropa de trabajo.

**Riesgos ambientales:** es tóxico a peces, no contaminar cursos de agua. No tóxico para abejas y prácticamente no tóxico para aves.

**Síntomas de intoxicación:** Es irritante ocular y medianamente irritante para la piel. En condiciones de laboratorio, en ratas, se observan los siguientes síntomas: Sedación, disnea, exoftalmia, postura curvada, pelaje erizado.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de **contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

En caso de **Inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

En caso de **ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Efectuar tratamiento sintomático y de sostén.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS"**

**"LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"**

**"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"**

**"NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO"**

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"**

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio Santiago, Chile. CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500.

**"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"**

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.

**Nota al comprador:** Garantizamos la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto se sustraer de nuestro control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su uso, manipulación o almacenamiento.

# MANCOLAXYL

FUNGICIDA  
POLVO MOJABLE  
(WP)

Lote N°: Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.577  
Fecha Vencimiento:

**MANCOLAXYL** es un fungicida sistémico y de contacto, preventivo y curativo que asegura una doble protección de las plantas, durante el período de activo crecimiento. Como se indica en el cuadro de Instrucciones de Uso.

**Composición:**

Metalaxilo \* .....8% p/p (80 g/kg)  
Mancozeb \*\* .....64% p/p (640 g/kg)  
Coformulantes c.s.p. ....100% p/p (1 kg)

\* N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato de metilo.  
\*\* Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cinquica.

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

**Cont. Neto:**

Fabricado por:  
**UPL Limited**  
Madhu Park, 11th Road  
Khar (West), Mumbai 400052,  
India

Distribuido por:  
**Arysta LifeScience Chile S.A. una empresa UPL**  
El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago  
ET2577-V002-OS1  
Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501  
<https://www.upl-ltd.com/cl>

**INSTRUCCIONES DE USO**

**MANCOLAXYL** es un fungicida sistémico y de contacto, que asegura una doble protección de las plantas, durante el período de activo crecimiento. Como se indica en el cuadro de Instrucciones de Uso.

**CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO**

Cultivo	Enfermedades	Dosis kg/ha	Observaciones
Tomate	Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans A1</i> ), Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> ), Caida de almácigos ( <i>Pythium spp.</i> )	2,5	Preventivo: Cuatro tratamientos a intervalos de 7 a 10 días. Caida de almácigos: Aplicar localizado a la hilera de siembra, cubriendo con abundante agua la planta, cuello y suelo alrededor de ella. Repetir a los 7 a 10 días con presión de la enfermedad.
Papa	Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans A1</i> ), Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> ), Pudrición de tubérculos ( <i>Pythium spp.</i> )	2,5	Tres aplicaciones a intervalos de 10 a 14 días, desde que aparezcan los primeros síntomas.
Tabaco	Pie negro ( <i>Phytophthora nicotianae</i> ), Caida de plantas ( <i>Pythium spp.</i> )	2,5	Aplicar una semana después del trasplante y cada 10 – 14 días. Para Caida de plantas: Aplicar localizado a la hilera de siembra, cubriendo con abundante agua la planta, cuello y suelo alrededor de ella. Repetir a los 7 a 10 días con presión de la enfermedad.
Pimentón	Marchitez ( <i>Phytophthora capsici</i> )	2,5	Aplicar preventivamente desde el trasplante. Y cada 10-14 días al existir condiciones favorables a la enfermedad.
Vid	Mildiu ( <i>Peronospora vitícola</i> )	300 g/100 L de agua	Aplicar preventivamente en brotación, de pre y post floración hasta el cierre de racimos. Cada 14 días.
Ajo, Brócoli, Bruselas, Cebolla, Chalota, Coliflor, Espinaca, Lechuga, Melón, Pepino, Puerro, Repollo, Sandía, Zapallo.	Mildiu ( <i>Peronospora destructor</i> , <i>P. parasitica</i> , <i>Bremia lactucae</i> ) Alternariosis Caida de plantas ( <i>Pythium spp.</i> )	2,5	Preventivo: Máximo 3 aplicaciones a intervalos de 10 a 14 días. Efectuar la primera aplicación al momento de observar los primeros síntomas. Para caída de plantas: aplicar localizado a la hilera de siembra cubriendo con abundante agua la planta, cuello y suelo alrededor de ella. Repetir los 7 a 10 días con presión de la enfermedad.
Frutilla, Frambuesa, Kiwi	Pudrición púrpura, Pudrición de la corona, Pudrición de la raíz	300 g/100 L de agua	Aplicar a inicios de los síntomas de la enfermedad y repitiendo con condiciones predisponentes cada 7 a 10 días con abundante volumen de agua.
Clementina, Limonero, Mandarina, Naranja, Pomelo, Tangelo.	Caida de plantas	2,5	Aplicar en el almácigo, localizado a la hilera cubriendo con abundante agua la planta, cuello y suelo alrededor de ella. Repetir a los 7 a 10 días con presión de la enfermedad.
	Pudrición del pie,	125 g/100 L de agua	Tratamiento mediante inmersión de raíces: al plantar en terreno definitivo durante 5 minutos.
	Gomosis	12,5g/m <sup>2</sup>	Aplicar al suelo a la proyección de la copa de árboles afectados. Luego regar para incorporar el fungicida.
	Pudrición parda de frutos	250-300 g 100 L de agua	Aplicar después de lluvia en precosecha, con buen cubrimiento dirigido a la parte baja de los árboles. Repetir con condiciones favorables. A los 7-10 días.

Nota: Utilizar las dosis mayores en caso de ataques severos, o cuando las condiciones climáticas sean altamente favorables para el desarrollo de la enfermedad.

**MÁXIMO CUATRO TRATAMIENTOS POR CULTIVO, POR TEMPORADA.**

**\* FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEPENDERÁ DE LA PRESIÓN DE LA PLAGA.**

**\* MOJAMIENTO:** - En cultivos bajos y frambuesa 400 a 800 l/ha, mojamiento menor con el cultivo poco desarrollado y mayor con el cultivo en pleno desarrollo. - En vides y cítricos 1.500 a 2.500 l/ha.

No aplicar en caso de lluvia inminente. No aplicar después de lluvias recientes y en condiciones de alta humedad. No aplicar contra el viento, ni cuando las condiciones ambientales favorezcan la deriva. No aplicar con temperaturas extremas, ni en horas de calor. No aplicar cuando las abejas estén activas.

**Preparación de la Aspersión:** Medir la cantidad requerida del producto y mezclarla con una pequeña cantidad de agua. Agregar el resto de agua necesaria, manteniendo el agitador funcionando.

**Compatibilidad:** Puede ser mezclado con todo tipo de fitosanitarios de uso común.

**Incompatibilidad:** No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina ni azulre.

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico cuando se usa según instrucciones de esta etiqueta.

**Carencia (días):** Tomate 3 días; Papa 7 días; Pimiento, Ajo, Cebolla, Coliflor, Repollo, 14 días; Tabaco, Chalota, Puerro, Brócoli, Bruselas, Sandía, Melón, Pepino, Zapallo, Lechuga, Frutilla, Clementina, Limonero, Mandarina, Naranja, Pomelo y Tangelo 21 días; Vid 35 días, Espinaca 40 días; Frambuesa 50 días; Kiwi 100 días.

**Tiempo de reingreso al Área Tratada (personas y animales):** No ingresar al área tratada hasta 24 horas de aplicado.

Marca registrada de UPL Limited.

240 mm

3,6 cm

