

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Simazina pertenece al grupo químico 1,3,5-triazinas. No comer, ni beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel. Durante la manipulación usar delantal impermeable, mascarilla, guantes y botas de goma. Durante la aplicación usar de protección, botas y guantes de goma, traje de PVC y máscara con filtro y gafas.

No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

Información ecotoxicológica: A la dosis de aplicación recomendada, Romazina, es prácticamente no tóxico a aves y peces y virtualmente no tóxico a abejas.

Síntomas de Intoxicación: Puede causar irritación del tracto respiratorio superior (nariz y garganta) y pulmones y problemas respiratorios. El contacto con la piel prolongado o repetido puede causar una leve irritación y enrojecimiento de la piel en personas susceptibles. Prácticamente no irritante para los ojos. Puede causar leve irritación, lagrimeo y enrojecimiento. Producto que normalmente no ofrece peligro por ingestión. Puede causar desordenes gastrointestinales como náuseas, vómito, dolor abdominal, dolores cólicos y diarrea, debilidad, temblores y convulsiones.

Puede producir hepatotoxicidad a dosis elevadas.

Antídoto: No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco o alejado del lugar de exposición.

Si no respira, proporcionar respiración artificial. Consulte a un médico.

En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua corriendo de la llave. En caso de ser necesario, acuda a un especialista.

En caso de contacto con los ojos: lave inmediatamente los ojos con agua limpia, durante 15 minutos, y cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 ó 20 minutos.

En caso de ingestión: No inducir al vómito. Nunca dar a ingerir o beber a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Consiga ayuda médica inmediatamente.

En todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un centro asistencial. Lleve la etiqueta o el envase.

Tratamiento médico: Estabilizar hemodinamicamente al paciente, incluyendo la permeabilidad de la vía aérea, adecuada monitorización de perfusión tisular, esfuerzo respiratorio y oxigenación. Se realizan medidas de descontaminación generales según la vía de ingreso dérmica, ocular o gastrointestinal. No existe antídoto específico; por lo tanto, el manejo consiste en medidas de soporte y sintomática.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y DE PERSONAS INEXPERTAS**

**LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS
INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS
VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS
AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS,
RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO
INDICADO DE REINGRESO**

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA,
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

En caso de intoxicación llamar:

Centro Atención Toxicológica UC (CITUC): 56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

v20072017

ROMAZINA

Herbicida

Granulado Dispersable (WG)

Romazina, es un herbicida selectivo de preemergencia, con acción residual sistémico y selectivo para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en frutales, espárragos, lupino y plantaciones forestales, señaladas en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo: % p/p (g/kg)

Simazina* 90.0% (900 g/kg)

Coformulantes c.s.p 100.0% (1 kg)

*6-cloro-N,N'-dietil-1,3,5-triazina-2,4-diamina

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.619

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°:

Cont. Neto: kg.

Fecha Venc.:

FORMULADO POR:

Agrospec

Camino El Milagro 257 - Maipú
Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

DISTRIBUIDO POR:

NEWPAT CHEMICALS SPA

Gerónimo Méndez 1891
Barrio Industrial
Coquimbo

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción:

Romazina, es un herbicida selectivo de preemergencia, con acción residual sistémico y selectivo para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en frutales, espárragos, lupino y plantaciones forestales, señaladas en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Equipo de aplicación: convencionales.

| Cultivo | Plaga | Dosis kg/ha | Observaciones |
|--|--|-------------|--|
| Arándanos Frambuesos Moras Zarzaparrillas | Malezas de hoja ancha: Amapola roja Bledo, Bolsita del pastor Bromo Clonqui Core-core Diente de león Duraznillo Hierba de la culebra Manzanilla Manzanilla hedionda Ñilhue Ortiga Ortiga muerta Pacoyuyo Pichoga Pimpinella escarlata o pimpinela azul Quilloi-Quilloi Quinguilla Rábano Sanguinaria Senecio o hierba cana Tomatillo Verdolaga Verónica Vicia o arvejilla Violeta Yuyo | 2 - 3,5 | Aplicar previo a la emergencia de las malezas en periodo de lluvias a fin de incorporar y activar el herbicida. No aplicar en plantas con menos de tres años de establecimiento, ni en suelos arenosos, Usar las dosis más altas en suelos más pesados y con mayor contenido de materia orgánica. Mojamiento mínimo: 100 L/ha. N° aplicaciones/temporada: 1 - 2. |
| Almendros Clementinas Damascos Durazneros Kiwis Limonos Manzanos Naranjos Nectarinos Nogales Olivos Paltos Perales Pomelos Vides | | 2 - 4 | |
| Espárragos | | | Aplicar antes de la emergencia de los turiones y en suelo libre de malezas. En el caso de espárrago blanco aplicar inmediatamente después de la aporca y regar si no llueve. No aplicar en el cultivo, si éste tiene menos de un año de establecimiento. Mojamiento mínimo: 300 L/ha. N° aplicaciones/temporada: 1. |
| Eucaliptus | | | Aplicar de pre y post-plantación, previo a la emergencia de las malezas sobre suelo húmedo y limpio de malezas. Usar las dosis más altas en suelos más pesados y con mayor contenido de materia orgánica. Mojamiento mínimo: 100 L/ha. N° aplicaciones/temporada: 1. |
| Lupino | Malezas gramíneas: Avenilla Ballica Chépica o pasto quila Hualcacho Poa o piojillo | 1,25 - 2 | Aplicar en pre-emergencia del cultivo y de las malezas. No aplicar en suelos arenosos. Usar las dosis más altas en suelos más pesados y con mayor contenido de materia orgánica. Mojamiento mínimo: 100 L/ha. N° aplicaciones/temporada: 1. |

Preparación de la mezcla: agregar Romazina, al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, luego completar el estanque y aplicar.

Fitotoxicidad: usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta Romazina no produce fitotoxicidad.

Precauciones: cultivos sensibles como arroz, avena, cebollas, cucurbitáceas, lechuga, remolacha, tomate, trigo, trébol, zanahoria, debe transcurrir 1 año para su establecimiento. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), y no aplicar con altas T° (mayores a 28°C).

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los pesticidas de uso corriente, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala si se desea mezclar con otro producto.

Incompatibilidad: es incompatible con productos de reacción alcalina.

Tiempo de reingreso al área tratada: como resguardo para el ingreso de personas, no ingresar al área tratada antes de 12 horas después de la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de cultivos cuya producción no está destinada a la alimentación animal.

Carencias: no corresponde indicar carencia,

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las malezas para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

