

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

ORTHENE 80 SP es un insecticida sistémico y de contacto. Su ingrediente activo, Acefato, pertenece al grupo químico de los Organofosforados. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial, máscara protectora de nariz y boca, delantal impermeable y overol impermeable que impidan el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. No respirar el polvo. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial, máscara protectora de nariz y boca. No respirar el polvo. Alejar los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar directamente ni contaminar corrientes de agua. Después del trabajo cambiarse y lavar la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, después del trabajo. Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de intoxicación pueden ser: vértigo, dolor de cabeza, contracciones musculares, temblores, disminución del pulso, náuseas, vómitos, dolores abdominales. **PRIMEROS AUXILIOS:** En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de **ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En caso de **contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En caso de **Inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Tratamiento Médico de Emergencia: La medición de la actividad de la colinesterasa en la sangre podría servir para la vigilancia y control de la exposición al material. Si aparecen signos de inhibición de colinesterasa, el sulfato de atropina es antídoto. **Antídoto:** Sulfato de atropina. El 2-PAM también es antídoto y puede usar junto con atropina, pero nunca debe usar solo. Aplicar tratamiento número dos.

ECOTOXICIDAD: ORTHENE® 80 ST es de baja toxicidad para peces. Es moderadamente tóxico para aves. Es tóxico para abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO EN LA ETIQUETA. LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 6353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 horas., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-Chile: 2 6619414/7771994. El teléfono del importador es: 2 5604500, Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto aplicándolo según nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



Lote N°:
Fecha Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1073

ORTHENE® 80 ST es un insecticida con acción sistémica y de contacto, el cual es usado como desinfectante de semillas. Controla una amplia gama de insectos que atacan las semillas y/o los primeros estados de desarrollo de las plántulas, los cuales se encuentran detallados en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

*Acefato..... 80 % p/p (800 g/kg)
Cofomulantes c.s.p..... 100 % p/p (1 kg)
*acetilfosforamidotiato de O,S-dimetilo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 1 Kilo

Fabricado por:
Arysta LifeScience North America LLC: 15401 Weston Parkway, Suite 150 Cary, NC 27513 EE.UU.
Arysta LifeScience Ecuador S.A.: Avenida Republica 396 y Almagro Quito Ecuador. Arysta LifeScience México: Av Insurgentes Sur N° 1605 piso 16, modulo 11, Col San José Insurgentes, C.P. 03900 México D.F. México. Arysta LifeScience: 38-39th Floor St. Luke's Tower, 8-1, Akashi-cho, Chuo-Ku, Tokyo 104-6591. Japón. Seiroka Garden Hai P.O.51.

Importado y Distribuido por:
Arysta LifeScience Chile S.A. El Rosal 4610, Huechuraba Santiago - Chile
ET1073 V-007-01
OS1

INSTRUCCIONES DE USO

ORTHENE® 80 ST es un insecticida sistémico y de contacto para el tratamiento de semillas, el cual posee un buen efecto residual. Es absorbido por las raíces y trasladado al resto de la planta, protegiéndola también contra ataques tempranos de insectos chupadores como langostinos y pulgones, e insectos masticadores como *Agrotis spp.* **ORTHENE® 80 ST** es usado para tratar semillas de maíz, porotos, remolacha azucarera, ballica y trigo.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

Semillas	Plagas	Dosis (g/100 kg de semillas)
Maíz	Gusanos cortadores, Delia.	800 - 1.000
	Gorgojo Argentino (larva y adulto) Gusano barrenador del maíz	1.000 - 1.500
Porotos (variedades grano pequeño)	Gusanos cortadores, Barrenador del maíz y Delia.	1.000
Porotos (variedades grano grande)		750
Remolacha azucarera		1.250
Ballica	Gorgojo Argentino (<i>Listronotus bonariensis</i> K.) Gusanos blancos: Pololo verde (<i>Hylamorpha elegans</i>) y Pololo café (<i>Phytoloema hermannii</i>) (*)	1.500
	Gusanos blancos: Pololo verde (<i>Hylamorpha elegans</i>) y Pololo café (<i>Phytoloema hermannii</i>) (*)	1.500

Nota: Cuando la presión de la plaga sea baja se recomienda usar la dosis menor. Cuando la presión de la plaga sea alta se recomienda usar la dosis mayor. Si la presión persiste es necesario complementar con **ORTHENE® 75 SP** foliarmente. Las dosis indicadas se deben mezclar con al menos 0,6 L de agua, pudiendo aumentar dependiendo de la semilla en cuestión.

(*) Ante presiones muy altas complementar siempre esta aplicación con insecticidas granulados o líquidos al suelo. No destinar las semillas tratadas para consumo humano y/o animal. No almacenar las semillas tratadas de un año para otro. El tratamiento de semillas dañadas mecánicamente, semilla de bajo vigor o mala calidad, puede dar como resultado una germinación reducida y/o una disminución del vigor de las semillas o plántula. Una vez tratada la semilla sembrar inmediatamente. En dosis superiores a 1,0 kg de **ORTHENE® 80 ST**, previo a la siembra se requiere hacer una prueba precisa de calibración en la maquinaria sembradora, de manera de asegurar la cantidad de semillas por metro lineal. En caso de no ocurrir lo anterior, evitar usar las dosis mayores a 1,0 kg de producto. En caso de duda consultar a nuestro Departamento Técnico. Puede existir variabilidad en la sensibilidad de los diferentes híbridos o variedades.

COMPATIBILIDAD: **ORTHENE® 80 ST** es compatible con los fungicidas que normalmente se usan en tratamientos de semillas: (ej: captan, thiram).

INCOMPATIBILIDAD: Evitar el contacto con materiales alcalinos.
FITOTOXICIDAD: **ORTHENE® 80 ST** no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta. Pueden existir sensibilidades varietales, por lo que se recomienda realizar una prueba previa.

PERÍODO DE CARENIA (DÍAS): No corresponde establecer periodo de carencia por su uso como desinfectante de semillas.
TIEMPO DE REINGRESO: No corresponde tiempo de reingreso por la naturaleza del tipo de aplicación. Apartar al ganado por un período de 21 días.
® **ORTHENE 80 ST** es Marca Registrada.

15 cm.



CUIDADO



2,25 cm.

FRANJA AZUL 293

NEGRO 100%