

26,6 cm.

HELVETICA NEUE CONDENSED 8

HELVETICA NEUE CONDENSED 7 a 24

HELVETICA NEUE CONDENSED 7

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Metalaxilo, ingrediente activo de **PROTEXYL® 350 WP** pertenece al grupo químico de las acilalaninas. Durante la preparación usar guantes impermeables, máscara para polvos, delantal impermeable y botas de goma. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, máscara con filtro, antiparras de seguridad y overol impermeable. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar cuidadosamente con abundante agua las partes del cuerpo que puedan haber tenido contacto con el producto. Remover la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla. Durante la aplicación mantener alejado a los animales domésticos y personas extrañas. No permanecer en la niebla generada al pulverizar el producto. Mantenga una buena higiene personal. No consumir o almacenar alimentos en el área de trabajo. **Condiciones de almacenamiento:** Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos perforados, secos y limpios, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autoridad competente. Evitar la contaminación del agua de riego o de uso doméstico. **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Puede ser tóxico si se ingiere. Puede ser dañino si se absorbe por la piel. Irritante a los ojos y piel.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco inmediatamente. Mantener al paciente en reposo. Si el paciente no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno y solicitar ayuda médica. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Consultar al médico. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. En caso de irritación consultar a un médico. **En caso de ingestión:** Lleve a un centro hospitalario inmediatamente. Si es ingerido, dar a beber 2 a 3 vasos de agua solo si el afectado está consciente y acudir inmediatamente a un centro asistencial. Aplique tratamiento base. NO provocar vómitos. **ANTÍDOTO:** No se conoce antídoto específico.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Aplicar tratamiento base. **ECOTOXICIDAD:** Ligeramente tóxico a peces. No tóxico a aves. No tóxico a abejas. **PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. **EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.** **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.** **NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2635 38 00, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 2777 19 94. El teléfono del importador es 2 2560 45 00, Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



Lote N°:
Fecha Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2820

PROTEXYL® 350 WP es un fungicida que posee acción sistémica, recomendado para el control de *Phytophthora pinifolia* en plantaciones forestales y viveros de pino, según lo indicado en el Cuadro de Instrucciones de Uso para aplicación terrestre y aérea.

COMPOSICIÓN:

Metalaxilo* 35 % p/p (350 g/kg)
Coformulantes c.s.p 100 % (1 kg)
* N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato de metilo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**NO INFLAMABLE
CORROSIVO PARA COBRE, HIERRO Y ALUMINIO
NO EXPLOSIVO**

Contenido Neto: 1 Kilo

Importa y Distribuye:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba
Santiago, Chile
ET2820V-003-01
OS1

Fabricado por:
Arysta LifeScience Sud África
PO Box 1726,
Mount Edgecombe 4300
Sud África
Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals Co., Ltd.
Liandun Rd, Houjing, Yanjiang Industrial Area,
Wenzhou, Zhejiang, P.R. China (325008)

INTRUCCIONES DE USO

PROTEXYL® 350 WP es un fungicida que posee acción sistémica, recomendado para el control de *Phytophthora pinifolia* en plantaciones forestales y viveros de pino, según lo indicado en el Cuadro de Instrucciones de Uso. **PROTEXYL® 350 WP** es absorbido por las hojas, tallos, raíces y actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en los hongos, por la interferencia con la síntesis de ARN ribosomal.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIÓN TERRESTRE Y AÉREA

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (g/hL)	OBSERVACIONES
Plantaciones forestales y viveros de pino	<i>Phytophthora pinifolia</i>	60 - 100 ó 0,6 - 1,0 kg/ha	Aplicar en forma preventiva cuando existan condiciones predisponentes para la enfermedad y repetir con un intervalo aproximado de 30 días entre ellas, realizando como máximo 4 aplicaciones por temporada. Para aplicación aérea, utilizar un mojado de 40 a 60 L de agua/ha. Para vivero utilizar 20 a 25 mL de solución por planta, usando bomba de espalda. Usar la mayor dosis y en condiciones de alta presión de la enfermedad. Utilizar PROTEXYL® 350 WP , alternando con fungicidas de diferentes grupos químicos y/o modos de acción.

Preparación de la mezcla: Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de **PROTEXYL® 350 WP** necesaria y agitando complete el volumen de agua necesario.

Métodos de aplicación: En aplicaciones terrestres, **PROTEXYL® 350 WP** puede ser aplicado con cualquier equipo pulverizador (por vía líquida), empleando agua limpia y en un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura del follaje. En aplicaciones aéreas, se recomienda el uso de MICRONAIR con volúmenes de aplicación de 5-10 L/ha o con boquillas convencionales de 40-60 L/ha. No aplique a las plantas bajo condiciones de estrés como sequía o inundaciones.

Compatibilidad: **PROTEXYL® 350 WP** es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Antes de realizar una mezcla, se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad.

Incompatibilidad: **PROTEXYL® 350 WP** es incompatible con productos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: **PROTEXYL® 350 WP**, no presenta fitotoxicidad en el cultivo para el cual se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Periodo de carencia (días): No corresponde por el tipo de cultivo al cual se aplica.

Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta pasadas 12 horas después de la aplicación, verificando que la aspersión se haya secado sobre la superficie tratada, a menos que se utilice ropa e implementos de protección. No corresponde indicar tiempo de ingreso a animales, ya que el producto no es utilizado en cultivos destinados a su alimentación.

Otras informaciones: El uso reiterado de fungicidas del grupo FRAC 4 al cual pertenece **PROTEXYL® 350 WP**, puede llevar a la selección natural de biotipos resistentes en algunas especies. Estos biotipos resistentes pueden llegar a ser dominantes por el uso repetido de este tipo de fungicidas del grupo FRAC 4, por lo que su nivel de control se puede ver afectado. Como una estrategia antiresistencia es recomendable alternar la aplicación de **PROTEXYL® 350 WP** con otros fungicidas de diferentes grupos químicos y/o modos de acción. La aparición de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de **PROTEXYL® 350 WP**, por lo que Arysta LifeScience Chile S.A. no se hace responsable por pérdidas sufridas debido a la falta de control de estas poblaciones resistentes. En caso de duda consultar a nuestro Departamento Técnico, o al especialista de su confianza. Debido a la naturaleza variable de los factores que inciden en la aplicación de este producto, no se da garantía de ninguna clase con respecto a sus efectos. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación.

© **PROTEXYL** es marca registrada de Arysta LifeScience Chile S.A.

14 cm.



CUIDADO



2,1 cm.

PANTONE 347 C

PANTONE NEGRO 100%