

PUNTO® 70 DS

INSECTICIDA

POLVO PARA TRATAMIENTO SECO DE SEMILLAS (DS)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1559

PUNTO® 70 DS, insecticida sistémico para tratamiento de semillas especialmente indicado para el control de insectos detallados en el cuadro de instrucciones de uso que atacan las plantas de cereales, remolacha, maíz y ballica durante las primeras etapas del desarrollo.

COMPOSICIÓN :

* Imidacloprid	70% p/p (700 g/kg)
Coformulantes c.s.p	100% p/p (1 kg)
* 1- (6-cloro-3-piridilmetil) N- nitroimidazolidin -2- ilidenamina.	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 Providencia
Santiago - Chile

Lote N° :

Contenido Neto :

Fecha Vencimiento :

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

Lampa, CHILE

HANGZHOU MARCH CHEMICALS Co. Ltd.

1701 Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road

Hangzhou - CHINA

GLEBA S.A

Avenida 520 y Ruta Provincial 36 (1903) Melchor Romero, La Plata

PROVINCIA BS AIRES- ARGENTINA

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

PUNTO® 70 DS Imidacloprid pertenece al grupo químico de los neonicotinoides. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

PUNTO® 70 DS, es prácticamente no tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos, moderadamente tóxico para aves y abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS >>

<<LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: ABC reanimación. Evaluar, realizar lavado gástrico, seguido de administración de carbón activado. Continuar con tratamiento sintomático y de sostén.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la zona expuesta con abundante agua de la llave. **En caso de contacto ocular:** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. **En caso de inhalación:** trasladar al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Acudir inmediatamente a un centro asistencial. **En todos los casos** llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Síntomas de Intoxicación: náuseas, vómitos, diarrea, mareos, fatiga, debilidad muscular, calambres, dificultad para respirar, taquicardia.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **PUNTO® 70 DS**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y adecuadamente exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada por ANASAC



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

PUNTO® 70 DS, insecticida sistémico para tratamiento de semillas indicado para el control de insectos detallados en el cuadro de instrucciones de uso durante las primeras etapas del desarrollo de los cultivos.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/100 kg semilla	OBSERVACIONES
REMOLACHA	Pulgones (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i>) Langostinos (<i>Paratanus exitiosus</i>) Pololo verde del sur Pololo café Gusanos blancos Gorgojo argentino Mosca de la semilla Gusano cortador de las chacras	130 g/UI de semilla monogérmica	Aplicar el tratamiento en el proceso de pildoración de la semilla con cubrimiento homogéneo.
TRIGO AVENA CEBADA CENTENO	Pulgones (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus persicae</i>) Gusanos blancos (<i>Hylamorpha elegans</i>) Mosca de la semilla Pololo café Pololo verde Gorgojo argentino	50-100	Tratamiento a la semilla, en seco o vía húmeda. Agregar 1.0 – 1.5 litros de agua por cada 100 kg de semilla.
MAIZ	Pulgones (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus persicae</i>) Mosca de la semilla Gorgojo argentino Gusano barrenador Gusano blanco del fréjol	500-750	Tratamiento a la semilla, en seco o vía húmeda. Agregar 0.25 litros de agua por cada 25 kg de semilla.
BALLICA	Gorgojo argentino Mosca Tana Pololo verde del sur Pololo café	140-150 g/ha	Tratamiento a la semilla, en seco o vía húmeda. Agregar 0.7 – 1.0 litros de agua por cada 25 kg de semilla.

Observaciones:

- Evitar mezclar la semilla con el producto a pala debido que la distribución y cobertura de esta es deficiente.
- Realice la desinfección de las semillas en un lugar bien ventilado e iluminado.
- Toda semilla tratada con el producto no es apta para consumo animal ni humano.

Preparación de la mezcla:

Tratamiento en seco: en un tambor rotativo de eje excéntrico, incorporar a la semilla la dosis de **PUNTO® 70 DS** recomendada y mezclar hasta obtener una adecuada distribución del producto.

Incompatibilidad:

Es incompatible con productos fuertemente alcalinos o ácidos.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. En remolacha hay una reducción del vigor inicial de las plántulas lo que no se traduce en menores rendimientos a la cosecha.

Reingreso al área tratada:

12 horas para ingresar al sector de tratamiento de las semillas sin equipo de protección personal, si este es un lugar cerrado.

Carencias:

No corresponden, por la época de aplicación.



CUIDADO

