

28,5 cm

# AGRITOX 750

**HERBICIDA  
CONCENTRADO SOLUBLE  
(SL)**

## INSTRUCCIONES DE USO:

AGRITOX 750 herbicida sistémico de post-emergencia para el control de malezas de hoja ancha.

AGRITOX 750 herbicida hormonal y selectivo para controlar malezas de hoja ancha en cereales solos, asociados con trébol o en cereales susceptibles a otros tipos de herbicidas.

**COMPOSICIÓN:**  
MCPA-dimetilamónio ..... 91,9% p/v (91,9 g/l)  
Colmetilamnes, c.s.d. .... 100% p/v (1 l)  
4-dicloro-2-olivolbactato de dimetilamónio (75 % p/v (750 g/l) de equivalente ácido de MCPA)

**Lote N.º:**  
**Fecha de vencimiento:**

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°3437

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**


**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

**Contenido Neto:** \_\_\_\_\_ Litros.

**Fabricado por:** Nulfarm Chile Ltda.  
Nulfarm Ltd.  
Crabtree Manorway North  
Belvedere, Kent DA 17 6 BQ  
Inglaterra

**Importa y Distribuye:** Nulfarm Chile Ltda.  
Av. Las Condes 11.380 Of.72  
Vitacura, Santiago, Chile

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.  
**Tratamiento médico de emergencia:** (descontaminación, funciones vitales).  
**Teléfonos de emergencia:**  
FITA - CHILE: (56 2) 2777 1994, NULFARM CHILE LTDA.: (56 2) 2215 9466.  
**Instrucciones para el triaje Lavado:**  
1- Vadee el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos. 2- Adicione agua limpia al envase, hasta ¼ de su capacidad. 3- Cierre el envase y agite durante 30 segundos. 4- Vierta el líquido en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realizar esta operación al menos tres veces. 5- Perfore el envase para evitar su realización. Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.



**NO CIVO**

Helvetica Narrow - Helvetica Bold Narrow - Cuerpo 8 pt

Helvetica Narrow - Helvetica Bold Narrow -  
Cuerpo 8 y 9 pt

Helvetica Narrow - Helvetica Bold Narrow -  
Cuerpo 8 y 7 pt

Pantone Yellow C

Pantone 100% negro

Cultivos	Malizas	Dosis/1ha	Observaciones
Tiño, Cebada Cerezo, Avena	Yuyo Pajaro Diente de León	0,6 - 1,0	Aplicar desde inicio de macolla (5 hojas) hasta antes del encachado. Máximo una aplicación por temporada.
Cereal asociado con trébol	Avefilla Kissaza Ortiga Cornihuela Hualtala	Aplicaciones terrestres, mo- vimiento de 100 a 150 litros de aguilina	Aplicar cuando el cereal tenga 5 hojas y el trébol tenga 3 a 4 hojas verdaderas (trifoliadas). Máximo una aplicación por temporada.
Arroz		Aplicaciones aéreas, movimiento de 20 a 40 litros de aguilina	Aplicar desde inicio de macolla, bajando el nivel del agua. Normalizar el nivel del agua 48 a 60 horas después de la aplicación. Máximo una aplicación por temporada.
			Aplicar cuando la gramínea tenga 5 hojas y la leguminosa 3 a 4 hojas iniciadas. Se recomienda solo aplicaciones terrestres. Máximo una aplicación por temporada.

**Preparación de la mezcla:** AGRITOX 750 se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar hasta volumen total con agitación constante.

**Incompatibilidad:** AGRITOX 750 es incompatible con gamnificadas selectivos de postemergencia y con sustancias o soluciones ácidas o alcalinas.

**Compatibilidad:** AGRITOX 750 es compatible con fertilizantes foliares.

**Fitotoxicidad:**

a) No pulverizar cerca de siembras o plantaciones susceptibles a herbicidas hormonales tales como porotos, remolacha, viñas, frijoles, tomates, papas. Las aplicaciones deben hacerse en días sin viento para evitar el arrastre de producto y causar daño a cultivos cercanos.

b) No se debe aplicar en el cultivo de maíz ni en cereales asociados con alfalfa.

c) No aplicar AGRITOX 750 en días excesivamente calurosos ni excesivamente fríos. No aplicar con viento superior a 5 km/h por vía terrestre para evitar la deriva del producto. La temperatura óptima de aplicación varía entre 12°C y 20°C.

d) Aplicar AGRITOX 750 en suelos con buena humedad, no aplicar en suelos con humedad insuficiente ya que puede dañarse la semilla y disminuir la efectividad del herbicida.

**Períodos de carencia:** No corresponde por el momento de aplicación.

**Tiempo de reintegro:** 48 horas después de realizada la aplicación. Ganado en pastoreo no debe ingresar a la área tratada hasta 15 días después de realizada la aplicación.

**NOTA AL COMPRADOR:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustituya de nuestro control directo.