27 cm

14 cm

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Grupo Químico: Ácido Giberélico pertenece al grupo químico de las Giberelinas.
GibGro® 10 LS es un Fitorregulador. **GibGro® 10 LS** es un producto que se considera no tóxico para los humanos y animales, sin embargo, los usuarios deben ceñirse a las recomendaciones habituales en el manejo de productos químicos. Esto es, no comer, beber o fumar durante su aplicación y preparación. Evitar la ingestión, inhalacion y contacto con la piel. Para su preparación y durante la aplicación usar de protección, protector facial, gorro, delantal impermeable, botas y guantes de goma. No aplicar con viento ni trabajar en la niebla de la solución asperjada. Después de la aplicación lave con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. No contaminar fuentes ni cursos de agua.
Riesgos ambientales: GibGro® 10 LS no es tóxico para peces, aves y abejas.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE AUTORIDAD COMPETENTE.
SINTOMAS DE INTOXICACION: No hay descripcion de sintomas de intoxicación.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Solicite asistencia médica. En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos despues de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberan utilizarse nuevamente. Solicite asistencia médica. En caso de **inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Solicite asistencia médica. En caso de **ingestión**: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Solicite asistencia médica.
ANTIDOTO: No es un producto tóxico. No tiene antídoto especifico.
Telefonos de emergencias:
RITA, Chile (56 2) 27771994. **NUFARM CHILE LTDA.** (56 2) 22159466.
Procedimiento de triple lavado: 1- Vacie el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos. 2- Adicione agua limpia al envase, hasta 1/4 de su capacidad. 3- Cierre el envase y agite durante 30 segundos. 4- Vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realizar esta operación al menos tres veces. 5- Perfore el envase para evitar su reutilización.
Conserve **GibGro® 10 LS** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, alejado de alimentos, forrajes o semillas.
NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayes cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo segun nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación estan fuera de nuestro control y no podemos prever todas las

GIBGRO® 10LS

FITORREGULADOR
Concentrado Soluble (SL)

GibGro® 10 LS es un Fitorregulador cuyo uso está recomendado en las especies de frutales y hortalizas indicadas en las Instrucciones de Uso.

COMPOSICION:
*Acido Giberélico:.....10% p/v (100 g/l)
Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1 l)
*Ácido (3S,3aR,4S,4aS,7S,9aR,9-bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-metil-6-metilen-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propeno[1,2-β]furan-4-carboxílico.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Lote N°:
Fecha de Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°4191

Contenido Neto: 1 Litro

Fabricado por: Nufarm Americas Inc.
150 Harvester Drive Suite 200
Burr Ridge, IL 60527, Estados Unidos.

Nufarm Australia Limited
103-105 Pipe Road Laverton, North Victoria 3026
Australia

Importa y Distribuye: Nufarm Chile Ltda.
Av. Las Condes 11380 Of.72
Vitacura, Santiago, Chile

INSTRUCCIONES DE USO: GibGro® 10 LS es un Fitorregulador cuyo uso está recomendado para las especies de frutales y hortalizas indicadas en las Instrucciones de Uso. **GibGro® 10 LS** actúa por contacto, teniendo cierto efecto sistémico. Su acción produce aumento en el crecimiento de los distintos órganos de la planta. Tiene uso generalizado en Uvas sin semillas, donde produce elongación del racimo, raleo y crecimiento de bayas. En hortalizas, dependiendo de la especie, aumenta la producción, facilita y adelanta la cosecha y acelera la brotación.

Cuadro de Instrucciones de Uso.

Cultivo	Dosis	Observaciones
Uvas Thompson Seedless (Sultanina) y Flame Seedless	Elongación de racimo: 20 - 40 gr de i.a./ha. Raleo de flores: 20-40 gr de i.a./ha. Crecimiento de bayas: 80 -200 g de i.a./ha/aplicación.	Elongación de racimo: realice una aplicación cuando el racimo se encuentre en plena floración. Para el caso de Flame Seedless, aplique 7 días después de la primera aplicación. Use la dosis mayor si hay un desarrollo vegetativo excesivo o si la planta se encuentra en un estado fenológico de floración muy desuniforme. Raleo de flores: aplique tres aspersiones después de la primera aplicación. Use la dosis mayor si hay un desarrollo vegetativo excesivo o si la planta se encuentra en un estado fenológico de floración muy desuniforme. Para el caso de Flame Seedless, aplique 7 días después de la primera aplicación. Crecimiento de bayas: realice una aplicación cuando el diámetro de bayas de 4-5 mm. Repita a los 7 días con la misma dosis. No aplique una cantidad mayor a 2,5 g de i.a./ha en el total de las aplicaciones por temporada. Para el caso de Flame Seedless, aplique 7 días después de la primera aplicación. Use la dosis mayor si hay un desarrollo vegetativo excesivo o si la planta se encuentra en un estado fenológico de floración muy desuniforme. Para el caso de Thompson Seedless, aplique 14 días después de la primera aplicación. No aplique una cantidad mayor a 500 g de i.a./ha en la suma de las 3 aplicaciones. Máximo 5 aplicaciones por temporada. Aplicar en dosis menores si el estado fenológico de las plantas es muy desuniforme.
Uva Emperor	20 ppm	Para aumentar el tamaño de bayas: aplique con un tamaño de baya de 12 mm. Una aplicación por temporada.
Uva Flame Seedless	Raleo de flores: 5 a 7,5 ppm. Aumento de tamaño en bayas: 30 a 40 ppm.	Raleo de flores: aplicar durante la floración. Esto también puede realizarse en dos etapas. La primera aplicación con 10% de flor y la segunda en plena floración, usando la mitad de la dosis en cada aplicación. Use la dosis mayor si hay un desarrollo vegetativo excesivo o si la planta se encuentra en un estado fenológico de floración muy desuniforme. Aumento de tamaño en bayas: aplique cuando el racimo presente bayas con un diámetro de bayas de 4 a 5 mm, repita a los 7 días con la misma dosis. No aplique una cantidad mayor a 2,5 g de i.a./ha en el total de las aplicaciones por temporada. Para el caso de Flame Seedless, aplique 7 días después de la primera aplicación. Use la dosis mayor si hay un desarrollo vegetativo excesivo o si la planta se encuentra en un estado fenológico de floración muy desuniforme. Para el caso de Thompson Seedless, aplique 14 días después de la primera aplicación. No aplique una cantidad mayor a 500 g de i.a./ha en la suma de las 3 aplicaciones. Máximo 5 aplicaciones por temporada. Aplicar en dosis menores si el estado fenológico de las plantas es muy desuniforme.
Uva Perlette	40 ppm	Aumento de tamaño de bayas: aplicar después de la cuaja con granos de 4 a 5 mm de diámetro. Una a dos aplicaciones por temporada de acuerdo al desarrollo fenológico de la planta.
Uva Red Seedless	Raleo de flores: 1 - 3 ppm. Aumento de tamaño en bayas: 25 ppm.	Raleo de flores: Use la dosis mínima cuando la floración se inicie en plena floración (~10% de flor). Aumento de tamaño de granos: aplicar cuando el racimo presente bayas con granos de 4 a 6 mm. Dos aplicaciones por temporada.
Uva Ruby Seedless	Raleo de flores: 1 ppm.	Raleo de flores: aplicar con 50% de flor. Una aplicación por temporada.
Uva Moscatel Seedless	Aumento de tamaño de bayas: 25 ppm.	Aumento de tamaño de bayas: aplicar con 75% de flor en dirección a los racimos. Una aplicación por temporada.
Uva Superior Seedless, Autumn Crimson	Crecimiento de bayas: 20 ppm.	Crecimiento de bayas: aplicar con granos de 4 a 5 mm. Una aplicación por temporada.
Uva Crimson Seedless	Para raleo de flores: 1,5 a 2,0 ppm. Para crecimiento en bayas: 20 ppm.	Para raleo de flores: aplica con 40 a 60% de floración. Usar la dosis mayor si hay un desarrollo poco apropiado de la planta, el estado fenológico es uniforme y/o se encuentra bajo temperaturas ambientales. Para crecimiento en bayas: aplicar con granos de 2 a 3 mm. Dos aplicaciones por temporada.
Uva Autumn Royal	Para raleo de flores: 1,0 a 1,5 ppm.	Para raleo de flores: aplicar en racimos de 10 cm. de largo. Una aplicación por temporada. Use la dosis mayor si hay un desarrollo poco apropiado de la planta, el estado fenológico es uniforme y/o se encuentra bajo temperaturas ambientales.
Uva Princesa (Melissa)	Para raleo de flores: 1,0 a 1,5 ppm. Para crecimiento de bayas: 20 ppm.	Para raleo de flores: aplicar con racimos de 10 cms. de largo. Use la dosis mayor si hay un desarrollo poco apropiado de la planta, el estado fenológico es uniforme y/o se encuentra bajo temperaturas ambientales. Para crecimiento de bayas: aplicar con granos de 9 a 11 mm. Dos aplicaciones por temporada.
Uva Red Globe	Para crecimiento de bayas: 10 a 20 ppm.	Para crecimiento de bayas: aplicar con granos de 12 a 15 mm. Dos aplicaciones por temporada con un intervalo mayor a 7 días. Para la primera aplicación use la dosis menor y para la segunda aplicación use el propósito use la dosis mayor.
Uva Italia	Para crecimiento de bayas: 10 a 20 ppm.	Para crecimiento de bayas: aplicar con granos de 9 a 11 mm. Una aplicación por temporada. Aplicar en dosis mayor si el estado fenológico de las plantas es muy desuniforme.
Almendro	Para adelantar la madurez: 7,5 ppm., a 10 ppm.	Para adelantar la madurez: aplicar a inicio de caída final. Una aplicación por temporada. Aplicar en dosis menores si el estado fenológico de las plantas es muy desuniforme.
Higos	Para estimular la brotación: 1 ppm.	Para estimular la brotación: aplicar antes de iniciarse el brote por temporada. Una aplicación por temporada.
Lechuga	10 ppm	Para obtener el desarrollo uniforme de las bulas productoras de semilla: realizar tres aplicaciones a cada base, cuando el cultivo tenga 4 a 5 y 12 hojas.
Naranjo	1,0 a 2,0 L de producto comercial/ha	Para reducir los gliegos, deterioro y quemadura causada por el aceite expresado: en el mismo fruto. Una aplicación por temporada. Use la dosis menor si el estado fenológico de la planta es muy desuniforme.
Limonero	2,50 a 5,00 L de producto comercial/ha	Para retrasar el desarrollo de pigmentos amarillos: aplicar cuando los frutos tengan un 75% de su tamaño final. Use la dosis menor si el estado fenológico es muy desuniforme.
Arándanos (Blueberries)	20 g de i.a./planta en suelos poco arenosos; 100 L de agua, se usan 200 cc. de producto comercial por 100 L. de agua.	Para mejorar la cuaja: debido a que el crecimiento natural producido en variedades como Cadillac, Jersey, Stanley, Early Blue, Weymouth, hacer una única aplicación floral de dosis y floración cuando el 75% de todas las flores estan completamente abiertas.
Ciruelos	Para obtener endurecimiento de los frutos, aumento del calibre y producir un color brillante: 10 ppm. En caso de que esta desuniformidad en la coloración: 15 ppm.	Para obtener endurecimiento de los frutos, aumento del calibre y producir un color brillante: aplicar cuando se observe color amarillo pajizo en ellos. En caso de que esta desuniformidad en la coloración: hacer 2 aplicaciones de 40 g/L con un intervalo de 10 días, 4 a 10 días, antes de cosechar, en las condiciones del caso. Aplicar al 50% de volumen de agua y con los requerimientos de 1500 a 3000 L/ha. Esta aplicación altera la cosecha.

NOTA: En todas las aplicaciones debe mojarse hasta el punto de escurrimiento.
PREPARACION DE LA MEZCLA: Mezclar la cantidad necesaria de **GibGro® 10 LS** con el volumen de agua requerido, dentro del estanque limpio y vacío. Salvo que se indique otro número en algún cultivo específico, los volúmenes recomendados por aplicación, son desde 1500 hasta más de 3000 litros de agua por hectárea. Siempre prepare solamente la cantidad de mezcla a utilizar, de manera que al final del día no sobren restos de ésta.
INCOMPATIBILIDAD: No existen datos concernientes a la incompatibilidad de **GibGro® 10 LS** con otros productos de uso agrícola.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.
TIEMPO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: despues de 4 horas. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso ya que el producto no es usado en aplicaciones a cultivos destinados a la alimentacion de éstos.
CARENCIA: Ninguna.
GibGro® 10 LS es Marca Registrada de NUFARM AMERICAS INC.

Helvetica Neue 57 Condensed - **Helvetica Neue 67 Medium Condensed** - Cuerpo 7 pt

Helvetica Neue 57 Condensed - **Helvetica Neue 67 Medium Condensed** - Cuerpo 8 pt

Helvetica 47 Light Condensed - Helvetica Neue 57 Condensed - **Helvetica Neue 67 Medium Condensed** - Cuerpo 6 y 7 pt

Pantone 347

Pantone 100% negro