

Precauciones y advertencias

Grupo químico: Himexazol pertenece al grupo químico de los **Isoxazoles**.

Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de productos fitosanitarios. No ingerir ni inhalar. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. Equipo de protección personal a utilizar durante la preparación: delantal impermeable, guantes impermeables (preferentemente de nitrilo), botas de goma, mascarilla para polvo y antiparras. Durante su aplicación utilizar: traje protector impermeable, guantes impermeables (preferentemente de nitrilo), botas de goma y protector facial completo. No comer, beber o fumar durante su manipulación y/o aplicación. No exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después del trabajo, lavar cuidadosamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de uso diario. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lavar el equipo de aplicación, inmediatamente después de finalizada la aplicación.

Precauciones para el medio ambiente: El producto no es tóxico para abejas ni peces. Ligeramente tóxico para aves y otros organismos acuáticos. No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases.

Almacenamiento: Transportar, comercializar y almacenar el producto en su envase original bien cerrado y provisto de su etiqueta. Conservar bajo llave en lugar seguro, fresco, seco y bien ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No almacenar junto a semillas, alimentos, forraje ni fertilizantes.

Síntomas de intoxicación: Irritación de los ojos. Náuseas, vómitos, dolor abdominal.

Primeros auxilios:

Al acudir a un médico o centro toxicológico llevar el envase del producto o su etiqueta. Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.

En caso de contacto cutáneo: Retirar la ropa y zapatos contaminados en forma inmediata y luego lavar la piel que haya entrado en contacto con el producto con abundante agua limpia. Si existe irritación cutánea, consultar a un médico.

En caso de contacto ocular: Lavar inmediatamente los ojos con agua limpia y fluyendo por al menos 15 - 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Cuando corresponda, después de los primeros 5 minutos retirar los lentes de contacto, y continuar lavando los ojos. En caso de presencia de irritación ocular, consultar a un especialista.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Llamar a un médico o centro de intoxicación.

En caso de ingestión: Si el afectado se encuentra consciente, dar a beber pequeñas cantidades de agua. No inducir el vómito. Acudir a un centro de intoxicaciones o a un médico.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento de acuerdo a la sintomatología del afectado.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

Teléfonos de emergencia:

(2) 2635 3800. Convenio CITUC/AFIPA (Atención las 24 horas).

(2) 2430 6300. Summit-Agro Chile SpA (Atención en horario de oficina).

Nota al comprador: Las informaciones proporcionadas en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de su control, debido a que la acción del producto puede estar influenciada por diversos factores. El comprador asume absolutamente, todos los riesgos de su uso y manejo correcto, procedase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los países de destino.

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.342

Contenido neto:

25 Kilos

Lote N°:

Fecha de Vencimiento:

TACHIGAREN 70 % WP

FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Fungicida sistémico que actúa inhibiendo el crecimiento micelial de enfermedades causadas por hongos descritos en el cuadro de instrucciones de uso. **Tachigaren 70 % WP** promueve el desarrollo aéreo y radicular de las plantas en que es aplicado.

Composición.

Ingrediente activo

Hymexazol (*) 70 % p/p (700 g/Kg)

Coformulantes c.s.p. 100 % p/v (1 Kg)

(*) 5-metilsoxazol-3-ol

**“LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

Instrucciones de uso:

Tachigaren 70 % WP, es un fungicida sistémico y fungostático, para ser utilizado en el control de enfermedades que atacan la zona radicular y el cuello de las plantas o como tratamiento de semillas.

Cuadro de Instrucciones de uso.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Remolacha.	<i>Pythium</i> spp., <i>Aphanomyces cochlioides</i> , Razas de <i>Fusarium oxysporum</i> y <i>Rhizoctonia solani</i> .	0,5 - 1,5 / 100 kg de semilla	Tratamiento a la semilla: aplicar inmediatamente antes de la siembra.
		25 - 30 g/U.I.*	En semilla monogérmica pildorada.
Melón, Sandía, Zapallo, Pepino.	<i>Fusarium oxysporum</i> <i>Pythium</i> spp.	300 - 600 g/100 Kg de semilla	En semilleros aplicar mezclado con la semilla, inmediatamente antes de la siembra.
		80 g/100 L de agua	En invernadero, con riego por goteo, aplicar con el primer riego, después del trasplante, dirigido al cuello de las plantas. Según condiciones, repetir cada 21 días. Sin riego por goteo, dirigir la aplicación al cuello de la planta.
Tomate.	Caída de plántulas (<i>Fusarium oxysporum</i> var. <i>licopersici</i>)	50 g/100 L de agua	En semilleros aplicar de pre o post-emergencia temprana.
		0,4 - 0,8 (según desarrollo del cultivo)	En invernadero aplicar con el primer riego después del trasplante.
Ornamentales (Clavel, Liliom, Crisantemo, Gladiolo)	Caída de plántulas (<i>Fusarium oxysporum</i>)	100 g/100 L de agua	En plantas propagadas por esquejes, antes de plantar aplique una solución al 0,1 %.

*1 UI = Equivalente a 100.000 semillas.

Para todos los tratamientos, realizar una aplicación durante la temporada.

Bajo condiciones de alta presión de las enfermedades, utilizar la mayor de las dosis.

Período de Carencia: En aplicaciones realizadas como tratamiento de semillas o al momento de la siembra, no corresponde establecer un período de carencia, debido al tiempo que transcurre desde la siembra a la cosecha. Para aplicaciones realizadas en invernadero, considerar los siguientes períodos de carencia: Melón, sandía, zapallo, pepino y tomates: 28 días. Plantas ornamentales: No corresponde establecer un período de carencia, debido a que su uso no está destinado a consumo humano.

Preparación de la mezcla: Coloque agua en el estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de **Tachigaren 70 % WP** en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través del filtro. Luego complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

Incompatibilidades: Incompatible con productos de reacción alcalina y fuertemente oxidantes.

Compatibilidades: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad o consultar a nuestro departamento Técnico.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las especies vegetales recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las Buenas Prácticas Agrícolas y a las instrucciones de esta etiqueta.

Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar al área tratada hasta transcurridas 12 horas después de la aplicación, verificando que los depósitos de la aspersión se hayan secado sobre la superficie tratada. Para animales, no corresponde indicar un tiempo de reingreso ya que los cultivos indicados no se destinan a uso animal en pastoreo.

SummitAgro
A Company of Sumitomo Corporation

Importado y distribuido por:
Summit-Agro Chile SpA
Orinoco 90, Oficina 2002,
Las Condes, Santiago.

Fabricado por:

ANASAC,
Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago - Chile.



CUIDADO



SUMMITAGRO CHILE SPA
ETIQUETA TACHIGAREN 70 % WP
Dimensiones: 21,5 x 30 cm.
4 Colores CMYB