

FUNGICIDA

TROFEO SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2776

TROFEO SC, es un fungicida recomendado para el control de los hongos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Pirimetanilo (*)	40% p/v (400 g/l)
Difenoconazol (**)	15% p/v (150 g/l)
Coformulantes, c.s.p.	100% p/v (1 l)

(*) N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina

(**) 3-cloro-4-[[2RS,4RS,2RS,4SR]-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil éter

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.

**Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE**

Letra N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA - CHILE

GLEBA S.A.

Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903), Melchor Romero, La Plata
Provincia de Buenos Aires - Argentina

Hualong Chemical Industry Co. Ltd.

17A Haihua Plaza, 658 North Jiangou Road, Hangzhou 310004- CHINA

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

TROFEO SC es un fungicida que contiene los siguientes ingredientes activos **Pirimetanilo** el cual pertenece al grupo químico de los anilinoimidazoles y **Difenoconazol**, perteneciente al grupo químico de los triazoles. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación de la suspensión concentrada usar delantal impermeable, máscara con filtro, gafas con protección lateral, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC, máscara con filtro, gafas con protección lateral, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

TROFEO SC, es ligeramente tóxico para peces, moderadamente tóxico para algas y microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. PARA EL TRIPLE LAVADO SE RECOMIENDA LLENAR EL ENVASE HASTA ¼ DE SU VOLUMEN CON AGUA, CERRAR Y AGITAR DURANTE 30 SEGUNDOS. ABRIR EL ENVASE Y VERTER ESTE RESIDUO AL TANQUE DEL EQUIPO PULVERIZADOR. REPETIR AL MENOS DOS VECES MÁS HASTA QUE EL AGUA DE DESECHO SEA CLARA. >>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpie la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. **En caso de contacto ocular:** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente, si la irritación persiste, consultar con un especialista. **En caso de inhalación:** retirar al paciente del área expuesta y llevarlo al aire libre. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **En todos los casos** mantenga al paciente en reposo mientras se le envía al hospital más cercano. **Síntomas:** aumento de salivación, diarrea e irritación gástrica que puede llegar a ulceraciones, congestión pulmonar, respiración lenta y débil. Posible hipertrofia del hígado (congestión centrilobular) con aumento de bilirrubina.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **TROFEO SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

TROFEO SC es un fungicida con acción sistémica y de contacto recomendado para el control de pudriciones causadas por *Botrytis cinerea* en vides.

Cuadro de Instrucciones de uso:

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Vides	Botritis	100 cc/HL o 1,5 a 2,0 Lt/ha	Aplicar con condiciones propicias a la enfermedad, en los momentos más favorables para su desarrollo: floración, antes de cierre de racimo, pinta y/o pre cosecha.	14

Instrucciones de uso:

Para lograr un buen cubrimiento, utilizar un volumen de agua adecuado para cada estado fenológico del cultivo, tipo de conducción y equipo de aplicación.

Efectuar máximo 3 aplicaciones por temporada, de manera no consecutiva. Dejar un intervalo mínimo de aproximadamente 14 días entre una aplicación y otra.

Alternar con fungicidas de distinto modo de acción.

Volumen de agua sugerido: 1.000 a 2.000 L/ha

Preparación de la mezcla:

Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **TROFEO SC**, manteniendo el agitador en marcha. Luego rellenar con agua hasta completar el volumen deseado, manteniendo agitación constante.

Incompatibilidad:

TROFEO SC es incompatible con productos que contengan Aluminio. Se recomienda hacer siempre una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

Fitotoxicidad:

No se presenta en el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 24 horas para ingresar al sector tratado, para personas y animales.



CUIDADO

