

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Fluoxastrobina, ingrediente activo de **VIGOLD®**, pertenece al grupo químico de las dihidrooxazinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, el contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Durante la preparación del producto usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, delantal impermeable, máscara con filtro y antiparras. Durante la aplicación del producto usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, máscara con filtro y antiparras. Quite el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de sacárselos. Tan pronto como sea posible, debe lavarse y ponerse ropa limpia. Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que hayan sido altamente contaminados con el producto. No vuelva a reutilizarlos. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. No inhalar los vapores o aspersiones del producto. No aplicar contra el viento. No contaminar alimentos, semillas, forrajes y cursos de agua. No permitir la entrada de terceras personas en áreas que estén siendo sometidas a tratamiento o manipulación del producto, así como de animales domésticos.

SINTOMAS DE INTOXICACION: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, apartar al afectado del área de peligro. Respirar aire fresco. Si el paciente no está respirando, dar respiración artificial. Si la respiración presenta dificultades, dar oxígeno. Llame a un médico inmediatamente. En caso de contacto con la piel, retirar ropa y zapatos. Lavar la zona afectada con abundante agua limpia durante 15 minutos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si ocurre irritación consulte a un médico. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además, los lentes no deberán de utilizarse nuevamente. Consultar al médico. En caso de ingestión, no inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Para todos los casos anteriores, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA: Realizar tratamiento base.

ECOTOXICIDAD: Es tóxico para organismos acuáticos, no contamine fuentes o cursos de agua vertiendo o eliminando restos del producto o sus envases. No es tóxico para aves y abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Triple lavado de los envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverización y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado bajo el programa.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 25604500, Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

VIGOLD®

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

Lote N° de fabricación:

Autorización del Servicio

Fecha de Vencimiento: .

Agrícola y Ganadero N° 2.858

VIGOLD® es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa (*) de amplio espectro, es efectivo contra las enfermedades y cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN

*Fluoxastrobina.....48% p/v (480 g/L)
Cofomulantes c.s.p.....100% (1 L)
*O-metiloxima de la (E)-[2-[6-(clorofenoxi)-5-fluoropirimidin-4-iloxi]fenil]5,6 dihidro-1,4,2-dioxazin-3 il) metanona

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido Neto: Litro

Importa y Distribuye:

ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A.

El Rosal 4610, Huechuraba,

Santiago, Chile.

ET2858-V002-xx

OS3

Fabricado por:
Arysta LifeScience North America; LLC
15401 Weston Parkway, Suite 150
Cary, NC 27513
Estados Unidos

Fabricado por:
Arysta LifeScience Colombia S.A.S.
Carrera 2 Este # 15-82
Madrid, Cundinamarca,
Colombia

Fabricado por:
Arysta LifeScience México SA de CV,
Carr. Saltillo – Mty km. 15.5
Parque Industrial,
25900 Ramos Arizpe, Coahuila
México

INSTRUCCIONES DE USO:

VIGOLD® es un fungicida que actúa interfiriendo con la respiración de los hongos patógenos de las plantas, y es un potente inhibidor de la germinación de las esporas y del crecimiento del micelio. Es efectivo contra las enfermedades y cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

Para la Aplicación Terrestre

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	MOMENTO DE LA APLICACIÓN
Papa	Rizoctoniasis (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2,0 - 3,0	Aplicar dirigido al surco al momento de plantación de los tubérculos. Usar un mojado de 600 L/ha para asegurar un buen cubrimiento. Use la dosis mayor, cuando la presión de la enfermedad sea alta.

(*) **Acción Curativa:** Entiéndase por acción curativa, la inhibición del desarrollo del hongo antes de la expresión de los síntomas (pre-sintoma) y no posterior a su aparición.

APLICACIÓN: Utilizar equipos convencionales de aplicación terrestre con 600 L de agua/ha.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar con agua el estanque de la pulverizadora hasta la mitad. Agregar la dosis indicada de **VIGOLD®** con el agitador funcionando y completar con agua hasta el volumen requerido. Mantener la agitación hasta que toda la mezcla se haya aplicado.

En caso de mezclar **VIGOLD®** con otro producto, siempre deje que cada uno se disuelva completamente y uniformemente antes de añadir el siguiente. Proporcionar suficiente agitación mientras se añade el resto del agua.

COMPATIBILIDAD: VIGOLD® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. **VIGOLD®** puede ser usado con un surfactante no iónico. Para mejorar el espectro de acción y evitar el desarrollo de resistencia, se sugiere usar en mezcla con otros fungicidas de diferente grupo químico o modo de acción.

INCOMPATIBILIDAD: Antes de realizar una mezcla, se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: VIGOLD® usado a las dosis indicadas en el cuadro de instrucciones, no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

PERÍODO DE CARENCIA (DÍAS): Papa: por época de aplicación no corresponde fijar carencia.

TIEMPO DE REINGRESO: No permitir la entrada de personas y/o de animales al área tratada antes de 12 horas.

OTRAS INFORMACIONES: Bajo ciertas condiciones naturales existe posibilidad de desarrollo de resistencia o diferente sensibilidad a fungicidas, como puede ocurrir con **VIGOLD®** o con productos de su mismo grupo químico (Grupo 11). Para prevenir el desarrollo de resistencia se recomienda alternar o mezclar con fungicidas de diferentes grupos químicos, o diferente modo de acción.

©VIGOLD es marca registrada de Arysta LifeScience Chile S.A.



CUIDADO

