

INSTRUCCIONES DE USO

WINSPRAY MISCIBLE COA, aceite parafínico miscible, con acción insecticida-acaricida de contacto, para el control de las plagas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso en manzanos, perales, durazneros, nectarinos, ciruelos, cerezos, kiwis, almendros, naranjos, limoneros, mandarinos, pomelos, olivos, arándanos, frambuesa, mora, zarzaparrilla, paltos y vides.

Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/hL	OBSERVACIONES
TRATAMIENTO SALIDA INVIERNO: MANZANO, PERAL DURAZNERO, NECTARINO CIRUELO, CEREZO, KIWI, ALMENDRO	Huevos de Arañitas (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>), Escama de San José, Conchuelas (<i>Parthenolecanium spp.</i>), Pulgón verde del manzano, Pulgón verde del duraznero.	1,5-2,0	Aplicar preferentemente al término del receso vegetativo, lo más tarde posible cuando las plagas comienzan a tener mayor actividad. En pomáceas, aplicar desde puntas verdes a ramillete expuesto. En ciruelos, hasta botón verde. En durazneros/nectarinos, hasta inicio de pétalos visibles. Vides, falsa araña de la vid, a partir de yema algodonosa en adelante.
VIDES	Falsa araña de la vid, Araña roja		
LIMONERO, NARANJO, MANDARINO, POMELO	Huevos y adultos de araña roja, araña bimaclada, Falsa araña roja. Conchuela negra del olivo, Chanchito blanco (<i>Pseudococcus calceolariae</i> , <i>P. longispinus</i> , <i>Planococcus citri</i>), Acaro de las yemas de los cítricos.	1,5	Aplicar según presión de la plaga con 70 % de eclosión de huevos, con adecuado cubrimiento. Evitar aplicar en floración y cuaja.
OLIVO	Conchuela negra del olivo		
ARÁNDANO, MORA, FRAMBUESA, ZARZAPARRILLA	Araña bimaclada Conchuela negra del olivo		
PALTO	Huevos y adultos de araña (<i>Oligonychus yothersi</i>), Conchuela negra del olivo, Escama blanca, Chanchito blanco (<i>Pseudococcus calceolariae</i> , <i>P. viburni</i> , <i>P. longispinus</i>)	0,7	Aplicar según presión de la plaga observando eclosión de huevos para controlar ninfas. Evitar aplicar en cuaja y floración.
TRATAMIENTO PRIMAVERA VERANO: DURAZNERO, NECTARINO, CIRUELO, CEREZO, MANZANO, PERAL	Huevos de adultos de arañas fitófagas (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Brevipalpus chilensis</i>) Escama de San José, Conchuelas (<i>Parthenolecanium spp.</i>) Chanchito blanco (<i>Pseudococcus calceolariae</i> , <i>P. viburni</i> , <i>P. longispinus</i>),	0,75-1,5	Aplicar para huevos y adultos de arañas fitófagas y Escama de San José 0,75-1,0 L/Hl. Para Conchuelas y Chanchitos blancos 1,0-1,5 L/Hl
VIDES, KIWI	Huevos y adultos de arañas fitófagas (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Brevipalpus chilensis</i>) Conchuelas (<i>Parthenolecanium spp.</i>) Chanchito blanco (<i>Pseudococcus calceolariae</i> , <i>P. viburni</i> , <i>P. longispinus</i>)		
REMOLACHA	Oídio	1 L/ha 0,25-0,3%	Cubrimiento mínimo 300 L de agua/ha Para aplicaciones terrestres.
USO COMO SURFACTANTE /COADYUVANTE		0,5 %	Para aplicaciones aéreas de ultra bajo volumen. Para mejorar la eficiencia de las aplicaciones, en mezcla con herbicidas, insecticidas y fungicidas.

• Realizar un máximo de 10 aplicaciones por temporada para frutales y vides y 5 aplicaciones por temporada para remolacha, con un intervalo mínimo de 7 días entre una aplicación y otra.

• Mojamientos recomendados: Carozos: 1000-2500 L/ha, Pomáceas: 1500-3500 L/ha, Kiwis: 1800-2500 L/ha, Berries: 500-1000 L/ha, Palto: 2000-8000 L/ha, Cítricos: 2000-10000 L/ha, Vides 400-1000 L/ha, Remolacha 300 L/ha, aplicación aérea 20-60 L/ha.

• Mojamiento recomendado para aplicación aérea 20 a 60 L/ha.

• Usar dosis menor con bajas presiones de la plaga y dosis mayor con presiones medias a altas.

• No aplicar con temperaturas mayores a 25°C, aplicar temprano en la mañana o al atardecer.

• No aplicar **WINSPRAY MISCIBLE COA**, con riesgo de heladas o los días inmediatamente después de una.

• No aplicar en plantas sometidas a estrés hídrico o durante un período prolongado de sequía.

• No aplicar después de lluvias reciente o en condiciones de alta humedad en el medio de desarrollo de la planta.

• Mantenga siempre el agitador funcionando durante la aplicación para evitar concentrar la solución y aplicar sobredosis.

• Evitar aplicar el "concho" del estanque, diluyéndolo en el siguiente estanque, de modo de reducir el riesgo de problemas originados por una agitación insuficiente.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la cantidad recomendada de **WINSPRAY MISCIBLE COA**, luego completar hasta el nivel deseado con agua, manteniendo agitación constante. Si se usa en mezcla con otros fitosanitarios estos deben agregarse después del aceite.

Incompatibilidad: Incompatible con azufre, captan dicofol, dinitros, dodine, folpet, dimetoato, Cihexatina, metiocarb, fosetilo-aluminio, carbarilo y ureas.

Compatibilidad: **WINSPRAY MISCIBLE COA** es compatible con insecticidas fosforados utilizados normalmente para potenciar la acción del aceite, como Troya 4 EC y Diazinon 600 EC.

Evitar aplicaciones con fertilizantes foliares o correctores nutricionales que contengan azufre.

Se debe distanciar las aplicaciones al menos 7 días.

No aplicar en mezcla con polvos mojables (WVP).

Fitotoxicidad: **WINSPRAY MISCIBLE COA** no es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda. En frutales puede aplicarse desde salidas de invierno hasta postcosecha, tanto en aquellos de hoja caduca como persistente. **NO APLICAR EN FLORACION Y DURANTE LA CUAJA DE LOS FRUTOS.** Evitar aplicaciones con azufre, fertilizantes foliares o correctores nutricionales que contengan azufre. Se debe distanciar las aplicaciones al menos 7 días.

Tiempo de reingreso: 4 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

Carencias: **WINSPRAY MISCIBLE COA** no tiene restricciones de carencia debido a que no deja residuos peligrosos en los cultivos.

CUIDADO

